

**Boa™**

**HERBICIDE**

**HERBICIDE IN WITLOOFWORTELTEELT, CHICOREI & DRUIVELAARS  
HERBICIDE EN CULTURE DE RACINES DE WITLOOF, CHICOREES, VIGNES et SORGHO (LUX)**

Bevat : OD – olie-dispersie op basis van 20 g/L penoxsulam  
Contient : OD – Dispersion huileuse à base de 20 g/L penoxsulam

Familie/famille : triazolpyrimidines (HRAC B)  
Erkenningsnummer/Numéro d'autorisation : 10848P/B  
Numéro d'agrément : L02225-066

Partijnummer : zie op de bus/No de lot : voir sur le flacon

Product bestemd voor beroepsgebruik/Produit destiné à un usage professionnel

™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

**Dow AgroSciences B.V.**

Kunstlaan 44  
B-1000 Brussel, België  
Website: [www.corteva.be](http://www.corteva.be)

Bij noodgevallen, contacteer SGS (Nederlands): **+32 3 575 0330** /  
En cas d'urgence veuillez contacter SGS (Français): **+32 474 555 786** /  
Im notfall wenden Sie sich an SGS (Deutsch) **+49 40 30 101 575**

**ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTI-POISONS 070/245.245  
POUR LE G.-D . DU LUXEMBOURG : (+352) 8002 5500**

**1 L e PET**

**GEVARENPICTOGRAMMEN / PICTOGRAMMES DE DANGER**



*GHS07*



*GHS09*

**SIGNAALWOORD : WAARSCHUWING / MENTION D'AVERTISSEMENT : ATTENTION  
GEVARENAANDUIDINGEN / MENTIONS DE DANGER**

- H315 Veroorzaakt huidirritatie / Provoque une irritation cutanée.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken / Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie / Provoque une sévère irritation des yeux.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen /  
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**AANVULLENDE INFORMATIE / INFORMATIONS ADDITIONNELLES**

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen / Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

0110354372003

## WAARBORG

De fabrikant is niet aansprakelijk voor risico's die voortvloeien uit het opslaan, gebruik en verwerken van BOA™ aangezien deze buiten zijn controle liggen. De fabrikant garandeert uitsluitend de samenstelling en de kwaliteit van het product dat wettelijk is toegelaten en overeenstemt met de formulering vermeld op het etiket.

## LEDIGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

De ledige verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (3 opeenvolgende malen schudden met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. Sduitoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten noch met het middel, noch met de verpakking vervuilen. De verpakking in geen geval herbruiken voor een ander doel. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.



www.agrirecover.eu

## WERKINGSSPECTRUM

### (Zeer) gevoelige breedbladigen in witloof en chicorei

Herderstasje  
Knopkruid  
Kamille  
Varkenskers (grote en kleine)  
Zwarte nachtschade  
Kruiskruid

### Weinig gevoelige en ongevoelige breedbladigen in witloof en chicorei

Tweejarige alsem  
Hondspeterselie

## GEBRUIKSAANWIJZING

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. De dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (*FAF-systeem in bieten*). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

## 1 - ERKENDE TEELTEN

Witloofwortelteelt (open lucht)  
Chicorei (open lucht)  
Druivelaars (tafeldruiven + voor wijnproductie) (open lucht)

## 2 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING

### 2-1 IN WITLOOF EN CHICOREI

**DOSIS**  
max 0.75 L/ha  
**STADIUM**

BOA kan toegepast worden vanaf droog zaad tot en met het '5 -bladstadium' van het gewas (BBCH 00-15).

Bij een zware aantasting of bij ontwikkelde onkruiden is het aangeraden te behandelen vanaf het '2-bladstadium' van het gewas en vervolgens een gefractioneerde behandeling toe te passen van 3 behandelingen met een maximale dosis van 0.25 L/ha per toepassing. Indien met de eerste behandeling kan gewacht worden, bij voorkeur 2 behandelingen met een maximale dosis van 0.375 L/ha per toepassing uitvoeren. Een interval van 7 dagen respecteren tussen de behandelingen.

Aanbevolen dosis bij fractionatie :

Stadium witloof en chicorei	BBCH 12	BBCH 13-14	BBCH 15
3 behandelingen *	0.250 L/ha	0.250 L/ha	0.250 L/ha
2 behandelingen *	--	0.375 L/ha	0.375 L/ha

\* 0.75 L/ha/jaar niet overschrijden = 15 g a.s./ha/jaar

BOA kan toegepast worden op alle variëteiten witloof/chicorei, zelfs de ALS gevoelige.

Symptomen van vergeling, vervorming of vertraging van de groei van het gewas kunnen mogelijks voorkomen 2 tot 3 weken na de behandeling met BOA. Deze zijn tijdelijk, zullen uiteindelijk verdwijnen en hebben geen invloed op de opbrengst of de kwaliteit.

### 2-2 IN DRUIVELAARS (tafeldruiven + voor wijnproductie)

**DOSIS**  
0.75 L/ha, max. 1 toepassing /12 maanden  
**STADIUM**

BOA gebruiken pré en post-knoppeuze tussen vegetatierust (winterogen spits tot rondbogen, al naar gelang de druivensort helder tot donkerbruin. Schubben van de

knop, al naar gelang de druivensort, meer of minder gesloten) en stadium waar de bessen zo groot zijn als erwten, druiven hangen (BBCH 00-75).

Het is aangeraden BOA te combineren met een ander herbicide dat een anti-kiemende werking bevat om zo het werkingspectrum te vergroten en de werking te verlengen en/of een bladherbicide met na-opkomst werking om de aanwezige onkruiden bij behandeling te bestrijden.

BOA aan een dosis van 0.75 L/ha heeft een selectieve werking bij alle wijnvariëteiten van minstens 4 jaar oud, zonder een restrictie betreffende de bodem. Jonge uitlopers moeten 30-40 cm afgedekt worden.

## 3 - WEERSOMSTANDIGHEDEN

BOA is weinig gevoelig aan weersomstandigheden tijdens de toepassing (temperatuur en luchtvochtigheid). Eén uur tussen de behandeling en regen is noodzakelijk voor een goede opname van het product.

## 4 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

## 5 - WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE VOLGGEWASSEN

In de herfst kunnen na een behandeling met BOA volgende teelten ingezaaid worden in het kader van een normaal rotatieschema na witloof of chicorei: tarwe, durumtarwe, gerst en tijdelijk grasland met raigras.

In de daaropvolgende lente kunnen na witloof of chicorei alle graangewassen ingezaaid worden.

Geen groenten- of sierteeltgewassen na chicorei en witloof.

## 6 - RESISTENTIEMANAGEMENT

Het herhaald gebruik op eenzelfde perceel van producten op basis van actieve stoffen met eenzelfde werkingswijze kan leiden tot het ontstaan van resistente organismen. Om dit risico te verminderen, wordt aangeraden om op hetzelfde perceel af te wisselen met formuleringen op basis van actieve stoffen uit andere chemische families of andere werkingsmechanismen.

## 7 - VEILIGHEIDSTERMIJN

In witloof, chicorei en druivelaars een wachttijd van 90 dagen respecteren vooraleer een volgend gewas te planten.

## 8 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet onmiddellijk en grondig schoongemaakt worden na gebruik van BOA, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

## TE VOLGEN STAPPEN BIJ HET REINIGEN

Ledig het spuittoestel volledig op het behandeld veld. Ledig zowel het spuitvat, de spuitarmen als de leidingen. Reinig onmiddellijk de inwendige en de uitwendige wanden van het spuittoestel met een hogedrukspuit in geval van polyethyleen of metaalachtige tank of een tuinslang. Met de hoge druk is er minder water vereist dan met de klassieke methode zonder druk. Vul daarna het spuitvat met een oplossing die 0.3 L ammoniak 20% bevat per 100 L water. Indien het toestel met hoge druk werd gereinigd, vul het vat voor  $\frac{1}{4}$ ; indien het met de tuinslang werd gereinigd, vul het vat dan voor de helft of volledig. Zet het roersysteem aan en laat het product inwerken gedurende 15 minuten. Ledig daarna het spuitvat en de spuitarmen en reinig met proper water. In alle gevallen, steeds de spuitdoppen en de filters demonteren en grondig reinigen in een emmer met goede afwaszeep. Het spoelwater verspreiden over de behandelde teelt.

## 9 - VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P261	Inademing van spuitnevel vermijden.
P280	Beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming dragen.
P302+P352	BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen gedurende ten minste 15 minuten.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.
SP1	Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPe3	Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobepalende maatregelen).
SPo	Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitloeistof is opgedroogd.

## 10 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

## 11 - EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

### NA INSLIKKEN:

De mond spoelen.

Het ANTIGIFCENTRUM (tel.: 070/245.245) of een arts raadplegen.

### NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM (tel.: 070/245.245) of een arts raadplegen.

### BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken.

Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Spoel WEG van het niet-aangetaste oog.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum **070/245.245** of SGS (Nederlands):

**+32 3 575 0330.**

## GARANTIE

Le fabricant n'est pas responsable des risques de stockage, de l'utilisation et de la manipulation de BOA™ puisqu'il n'a aucun contrôle sur ceux-ci. Le fabricant garantit exclusivement la composition et le contrôle de qualité du produit qui est légalement autorisé à la vente et qui correspond à la formule mentionnée sur l'étiquette.

## EMBALLAGE VIDE ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage vide de ce produit doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fosses avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



www.agrirecover.eu

## SPECTRE D'ACTIVITE

### Dicotylées (très) sensible en witloof et chicorée

Capselle bourse à pasteur  
Galinsoge  
Camomille  
Repousses de colza  
Senebière corne-de-cerf et senebière didyme  
Séneçon  
Morelle noire

### Dicotylées peu à très peu sensibles en witloof et chicorée

Armoise commune  
Ethuse ciguë

## MODE D'EMPLOI

La dose agréée est la dose minimale garantissant la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (*FAR en betteraves*). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

## 1 - CULTURES AGREES

Culture de racines de witloof (plein air)

Chicorée (plein air)

Vigne (raisins de table + pour production de vin) (plein air)

Sorgho (ensilage + grain) (seulement pour Luxembourg)

## 2 - DOSES ET STADES D'APPLICATION

### 2-1 EN WITLOOF et CHICOREE

#### DOSE

Max 0.75 L/ha

#### STADE

BOA s'applique du stade semence sèche jusqu'au stade '5 feuilles' (BBCH 00-15).

En cas de forte infestation ou de stade avancé des adventices, il est conseillé de traiter dès le stade '2 feuilles' de la culture et d'appliquer alors un programme avec trois applications de 0.25 L/ha au maximum par passage; lorsque la première application peut attendre, préférer alors le programme à deux applications de 0.375 L/ha au maximum par passage. Les applications se feront en respectant un intervalle de 7 jours entre deux applications.

Fractionnement de dose conseillé :

Stade des chicorées & witloof	BBCH 12	BBCH 13-14	BBCH 15
3 applications*	0.250 L/ha	0.250 L/ha	0.250 L/ha
2 applications*	--	0.375 L/ha	0.375 L/ha

\* 0.75 L/ha/an étant la dose maximale à ne pas dépasser soit un apport maximum de 15 g a.s./ha/an

BOA peut s'utiliser sur toutes les variétés de witloof/chicorée, même celles sensibles aux ALS.

Des symptômes de jaunissement, de déformation ou de ralentissement de croissance des cultures de chicorées/witloof peuvent survenir dans les deux ou trois semaines suivant l'application de BOA. Ils disparaissent par la suite et sont sans effet sur le rendement de la culture et la qualité de la production de chicons.

## 2-2 EN VIGNE (raisins de table + pour production de vin)

#### DOSE

0.75 L/ha, 1 application/12mois.

#### STADE

BOA est utilisable en pré et post-débourrement entre bourgeon d'hiver (période d'hiver (dormance) stade de repos, œil presque entièrement recouvert par deux écailles brunâtres. Les bourgeons sont pointus à arrondis selon les cépages) et le stade du développement des baies (les baies atteignent 50% de leur taille finale, soit la grosseur d'un petit pois. Les grappes basculent et prennent la forme typique du cépage (BBCH 00-75).

Il est conseillé d'associer BOA à un autre herbicide à action anti-germinative afin d'élargir son spectre d'action et prolonger sa durée d'action et/ou à un herbicide foliaire de post levée afin d'éliminer les adventices présentes lors de l'application.

BOA à 0.75 L/ha est sélectif de toutes les variétés de vigne plantées depuis au moins 4 ans, sans restriction de type de sol. Les jeunes pieds remplaçant les manquants devront être protégés par un manchon de 30 à 40 cm.

## 2-3 EN SORGHO COMMUN (ensilage + grain) (seulement pour Luxembourg)

#### DOSE

0.8 L/ha

#### STADE

Dans les sorghos, BOA est utilisable à partir du stade '3 feuilles' et jusqu'au stade '5-6 feuilles' de la culture (ne pas traiter avant le stade '3 feuilles'). Pour obtenir un niveau d'efficacité optimale, il est préférable de traiter dès le stade 3 feuilles du sorgho sur des adventices jeunes :

- Panisses : 1 feuille à début tallage,
- Chénopodes : cotylédons à 6 feuilles.

Des symptômes de jaunissement ou de tassement des cultures de sorgho peuvent survenir dans la semaine suivant l'application de BOA. Ils disparaissent rapidement par la suite et sont sans effet sur le rendement de la culture. Dans les sorghos, ne pas appliquer par des températures supérieures à 25°C.

## 3 - CONDITIONS CLIMATIQUES

BOA est peu sensible aux conditions climatiques lors de l'application (température et humidité de l'air). Un délai d'une heure sans pluie est nécessaire pour une bonne pénétration du produit dans la plante.

## 4 - MESURES DE REDUCTION DU RISQUE

Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.

**Luxembourg (sorgho) :** Pour protéger les plantes non cibles, respecter une zone non traitée de 5m par rapport à la zone non cultivée adjacente. Respecter une distance d'au moins 5 m entre la surface à traiter et toute surface ou cours d'eau.

## 5 - AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES CULTURES DE REMPLACEMENT ET SUIVANTES

En automne, à la suite d'un traitement avec BOA, il est possible de semer les cultures suivantes dans le cadre d'une rotation normale après chicorée ou witloof: froment d'hiver, blé dur, escourgeon, épeautre, triticale et prairie temporaire de ray-grass. Au printemps suivant la culture de chicorées ou witloof: toutes céréales.

Les cultures maraîchères et ornementales sont à exclure après une culture de chicorée ou witloof.

## 6 - PREVENTION DE LA RESISTANCE

L'utilisation répétée, sur une même parcelle, de préparations à base de substances actives ayant le même mode d'action, peut conduire à l'apparition d'organismes résistants. Pour réduire ce risque, il est conseillé d'alterner, sur un même site, des préparations à base de substances actives de familles chimiques différentes ou à modes d'actions différents.

## 7 - DELAI AVANT RECOLTE

Chicorée, Witloof et vigne : un délai de 90 jours doit être respecté avant plantation d'une culture suivante.

**Luxembourg** : Un délai de 60 jours doit être respecté pour sorgho (ensilage) et de 90 jours pour sorgho (grain).

## 8 - NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR

Il faut nettoyer à fond le pulvérisateur immédiatement après l'utilisation de BOA pour éviter tous dégâts dans les cultures sensibles pulvérisées à la même époque avec le même pulvérisateur.

### SUITE DES OPÉRATIONS

Vider la cuve complètement sur la terre jusqu'à l'apparition de vapeur aux buses. Vidanger la cuve, les rampes et les canalisations. Immédiatement nettoyer intégralement les parois extérieures et intérieures du pulvérisateur soit avec les têtes rotatives de nettoyage dans la cuve soit avec un appareil à haute pression soit au tuyau d'arrosage. La haute pression sera réservée aux cuves en polyéthylène ou en métal exclusivement. La haute pression nécessite beaucoup moins d'eau que la méthode classique sans pression. Il faudra ensuite remplir la cuve avec une solution contenant 0.3 L d'ammoniaque du commerce à 20% par 100 L d'eau. Si la haute pression a été utilisée, remplir la cuve au 1/4 de sa capacité. Si le nettoyage des parois a été effectué au tuyau d'arrosage, il faudra remplir la cuve à moitié ou complètement. Mettre l'agitation en marche et laisser agir pendant 15 minutes. Vidanger la cuve et les rampes et rincer à l'eau claire. Dans tous les cas, démonter les buses et les filtres et les nettoyer à fond dans un seau contenant un bon savon de vaisselle. Epandre les eaux de rinçage dans les terres traitées.

## 9 - CONSEILS DE PRUDENCE

P261 Éviter de respirer les brouillards.  
P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.

P302+P352

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon pendant minimum 15 minutes.

P305+P351+P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P333+P313

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P337+P313

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P391

Recueillir le produit répandu.

SP1

Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage

SPe3

Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

SPo

Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

## 10 - CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

## 11 - CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

### EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS tél : 070/245.245 (pour la Belgique) ou (+352) 8002 5500 (pour le G.-D. du Luxembourg) ou un médecin.

### EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS tél : 070/245.245 (pour la Belgique) ou (+352) 8002 5500 (pour le G.-D. du Luxembourg) ou un médecin en cas de malaise.

### EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés.

Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint.

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons **070/245.245** (pour la Belgique), **(+352) 8002 5500** (pour le G.-D. du Luxembourg) ou SGS (Français) : **+32 474 555 786**.

**Boa™**

**HERBICIDE**

**HERBICIDE IN WITLOOFWORTELTEELT, CHICOREI & DRUIVELAARS  
HERBICIDE EN CULTURE DE RACINES DE WITLOOF, CHICOREES, VIGNES et SORGHO (LUX)**

Bevat : OD – olie-dispersie op basis van 20 g/L penoxsulam  
Contient : OD – Dispersion huileuse à base de 20 g/L penoxsulam

Familie/famille : triazolpyrimidines (HRAC B)  
Erkenningsnummer/Numéro d'autorisation : 10848P/B  
Numéro d'agrément : L02225-066

Partijnummer : zie op de bus/No de lot : voir sur le flacon  
Product bestemd voor beroepsgebruik/Produit destiné à un usage professionnel

™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

**Dow AgroSciences B.V.**  
Kunstlaan 44  
B-1000 Brussel, België  
Website: [www.corteva.be](http://www.corteva.be)

Bij noodgevallen, contacteer SGS (Nederlands): **+32 3 575 0330** /  
En cas d'urgence veuillez contacter SGS (Français) : **+32 474 555 786** /  
Im notfall wenden Sie sich an SGS (Deutsch) **+49 40 30 101 575**

**ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTI-POISONS 070/245.245**  
**POUR LE G.-D . DU LUXEMBOURG : (+352) 8002 5500**

**1 L e PET**

**GEVARENPICTOGRAMMEN / PICTOGRAMMES DE DANGER**



GHS07



GHS09

**SIGNAALWOORD : WAARSCHUWING / MENTION D'AVERTISSEMENT : ATTENTION  
GEVARENAANDUIDINGEN / MENTIONS DE DANGER**

- H315 Veroorzaakt huidirritatie / Provoque une irritation cutanée.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken / Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie / Provoque une sévère irritation des yeux.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen /  
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**AANVULLENDE INFORMATIE / INFORMATIONS ADDITIONNELLES**

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen / Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.