

**Closer™**  
Isoclast™ active

**INSECTICIDE**

**Voor gebruik in sierplanten, groententeelt en aardappelen  
Pour usage en plantes ornementales, maraîchère et pomme de terre**

Bevat : SC - suspensieconcentraat op basis van sulfoxaflor 120 g/L  
Contient : SC - suspension concentrée à base de sulfoxaflor 120 g/L  
Familie / famille : sulfoximinen / sulfoximines (IRAC 4C)  
Erkenningsnummer / Numéro d'autorisation : 10752P/B  
Partijnummer : zie op de bus / No de lot: voir sur le flacon  
Product bestemd voor beroepsgebruik /  
Produit destiné à un usage professionnel



A 6 0 0 0 5 6 5 7

**Dow AgroSciences BV**  
Kunstlaan 44  
B-1000 Brussel, België  
Website: [www.corteva.be](http://www.corteva.be)

™ Trademarks of Corteva Agriscience  
and its affiliated companies.

**1 L e PET**

UFI: NF87-802G-S00E-WJN4

GEVARENPICTOGRAMMEN / PICTOGRAMMES DE DANGER / GEFAHRENPIKTOGRAMME



**GHS09**

**GEVARENAANDUIDINGEN**

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**MENTIONS DE DANGER**

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**GEFAHRENHINWEISE**

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**AANVULLENDE INFORMATIE**

EU208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**INFORMATIONS ADDITIONNELLES**

EU208 Contient 1,2-benzisothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique.

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**SONSTIGE ANGABEN**

EU208 Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Bij noodgevallen, contacteer SGS (Nederlands): **+32 3 575 0330** / En cas d'urgence veuillez contacter SGS (Français) :  
**+32 474 555 786** / Im Notfall wenden Sie sich an SGS (Deutsch): **+49 40 30 101 575**

**ANTIGIFCENTRUM / CENTRE ANTIPOISONS : 070/245.245**

**MANDATORY REQUIREMENT:  
THIS AREA MUST BE BLANK  
(for 2D Data Matrix, Lot Nr.,  
Manufacturing Date ...)**



## WAARBORG

De fabrikant is niet aansprakelijk voor risico's die voortvloeien uit het opslaan, gebruik en verwerken van CLOSER™ aangezien deze buiten zijn controle liggen. De fabrikant garandeert uitsluitend de samenstelling en de kwaliteit van het product dat wettelijk is toegelaten en overeenstemt met de formulering vermeld op het etiket.

## LEGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

De lege verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (3 opeenvolgende malen schudden met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. Spuitoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvoorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten noch met het middel, noch met de verpakking vervuilen. De verpakking in geen geval herbruiken voor een ander doel. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.



## GEBRUIKSAANWIJZING

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximaal aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten. Alhoewel deze algemene opmerking van toepassing is voor de meeste gewasbeschermingsmiddelen, wil Corteva Agriscience erop wijzen dat de vermindering van de dosering van een insecticide tot de opbouw van resistentie kan leiden.

## 1 - ERKENDE TEELTEN

Tomaten (onder bescherming)  
Aubergine / eierplant en pepino (onder bescherming)  
Paprika / spaanse peper (onder bescherming)  
Komkommer (onder bescherming)  
Chayote (onder bescherming)  
Augurk (onder bescherming)  
Courgette / patisson (onder bescherming)  
Meloen, watermeloen en pompoen (onder bescherming)  
Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) (onder bescherming)  
Aardappelen en aardappelpootgoed (open lucht)

Bataat (zoete aardappel) (open lucht)  
Vicia-bonen (paarden-, duiven-, tuin-, ...) (groengeogst, zonder peul) (open lucht)  
Kolen : broccoli, spruitkool, bloemkool (witte en groene), chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna, sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)  
Rode biet (kroten) (open lucht)  
Slasoorten (open lucht en onder bescherming)  
Spinazie (open lucht en onder bescherming)  
Chicorei (open lucht)  
Witloofwortelteelt (open lucht)

## 2 - DOSERING en TIJDSTIP VAN TOEPASSING

**2-1 - TOMAAT, AUBERGINE / EIERPLANT & PEPINO, PAPRIKA / SPAANSE PEPER, KOMKOMMER, CHAYOTE, AUGURK, COURGETTE / PATISSON, MELOEN, WATERMELOEN en POMPOEN (onder bescherming)**

### STADIUM:

CLOSER toepassen tussen het stadium waarbij de eerste primaire zijscheut zichtbaar is en 70% van de vruchten de typische kleur van volledige rijpe vruchten vertoont (BBCH 21-87).

### DOSIS:

CLOSER 1 tot 2 keer toepassen met een 7 dagen interval.

**VERTICALE TEELT (tomaat, aubergine / eierplant & pepino, paprika / spaanse peper, komkommer, chayote, augurk, courgette / patisson, meloen, watermeloen) :** Maximale dosis 0,16 L/ha haag / teelt.

**Tegen bladluis (Aphididae) :** 0,08 L/ha haag, 1 tot 2 toepassingen met een interval van minstens 7 dagen.  
**Tegen witte vlieg (Trialeurodes vaporariorum, Bemisi tabaci) :** Ofwel 1 tot 2 behandelingen met 0,08 L/ha haag met een minimum interval van 7 dagen, ofwel 1 behandeling met 0,16 L/ha haag.

**HORIZONTALE TEELT (augurk, courgette/patisson, meloen, pompoen, watermeloen) :** Maximale dosis 0,4 L/ha.

**Tegen bladluis (Aphididae) :** 0,2 L/ha, 1 tot 2 toepassingen met een interval van minstens 7 dagen

**Tegen witte vlieg (Trialeurodes vaporariorum, Bemisi tabaci) :** Ofwel 1 tot 2 behandelingen met 0,2 L/ha met een minimum interval van 7 dagen, ofwel 1 behandeling met 0,4 L/ha.

Een veiligheidsstermijn van 1 dag respecteren.

Dow AgroSciences is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de teelt van watermeloen en chayote. Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Non-printed area on page 2 ONLY (on the back of «Label A-code + Barcode area»)

Non-printed area on page 2 ONLY (on the back of 2D code area printed on the front page)

## 2-2 - SIERTEELT (niet voor consumptie) (onder bescherming)

### STADIUM:

CLOSER toepassen tussen het 2-bladstadium tot de eerste bloemblaadjes zichtbaar zijn (de bloem is nog gesloten) (BBCH 12-59).

### DOSIS:

CLOSER 1 tot 2 keer toepassen met een spuitinterval van 7 dagen.

Maximale dosis 0,04 L/100 L/teelt.

Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soorten : *Bellis*, *Calendula*, *Chrysanthemum*, *Euphorbia*, *Geranium*, *Gerbera*, *Lantana* en *Nicotiana*. Het is aangeraden een proefbespuiting uit te voeren indien er nog geen ervaring werd opgedaan bij een bepaalde variëteit of cultivar.

**Tegen bladluis (*Aphididae*)** : 0,02 L/100 L, 1 tot 2 toepassingen met een interval van 7 dagen.

**Tegen witte vlieg (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*)** : Ofwel 1 tot 2 behandelingen met 0,02 L/100 L met een minimum interval van 7 dagen, ofwel 1 behandeling met 0,04 L/100 L.

## 2-3 - AARDAPPEL, AARDAPPELPOOTGOED en BATAAT (zoete aardappel) (open lucht)

### STADIUM:

CLOSER toepassen na de bloei (> BBCH 70)

### DOSIS:

**Tegen bladluis (*Aphididae*)** : 0,2 L/ha, 1 tot 2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen. Een wachttijd van 7 dagen voor de oogst respecteren.

Dow AgroSciences is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de teelt van zoete aardappel. Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

## 2-4 - VICIA-BONEN (paarden-, duiven-, tuin-, ...) (groengeoogst, zonder peul) (open lucht)

### STADIUM:

CLOSER toepassen tussen het stadium bloemknoppen gevormd, nog omhuld door bladeren en het stadium eerste kroonbladeren zichtbaar, bloemknoppen talrijk maar nog steeds gesloten (BBCH 50-59), ten laatste 6 dagen voor het begin van de bloei ofwel toepassen na de bloei (> BBCH 70). Maximum 2 toepassingen per teelt met een interval van 21 dagen.

### DOSIS:

**Tegen bladluis (*Aphididae*)** : 0,2 L/ha, 1 tot 2 toepassingen met een interval van minstens 21 dagen. Bij de toepassing na de bloei een wachttijd van 14 dagen voor de oogst respecteren.

Dow AgroSciences is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de teelt van vicia-bonen. Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

## 2-5 - KOLEN (broccoli, spruitkool, bloemkool (witte en groene), chinese kool, paksoi, tatsoi, komatsuna, sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi- en spitskool) (open lucht)

### STADIUM:

**Broccoli**: CLOSER toepassen tussen het stadium eerste zijscheut zichtbaar en het stadium kool heeft een typische grootte en vorm bereikt en is gesloten (BBCH 21-49).

**Spruitkool**: CLOSER toepassen tussen het stadium waarin de hoofdstengel 10% van variëteiten specifieke lengte heeft bereikt en het stadium dat de spruitjes onder de eindscheut nauw gesloten zijn (BBCH 31-49).

**Bloemkool (witte en groene)**: CLOSER toepassen tussen het stadium waarin de roosjes zich ontwikkelen (grootte > 1cm) en het stadium dat de kool zijn heeft typische grootte en vorm heeft bereikt en is gesloten (BBCH 41-49).

**Chinese kool, paksoi, tatsoi en komatsuna en sluitkool (kabuiskool, witte, rode, savooi-en spitskool)**: CLOSER toepassen tussen het stadium van begin vorming van de kool (2 jongste bladeren ontvouwen niet meer) en het stadium dat de typische grootte, vorm en stevigheid van kool is bereikt (BBCH 41-49).

### DOSIS:

**Tegen bladluis (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)** : 0,2 L/ha, 1 toepassing. Een wachttijd van 7 dagen voor de oogst respecteren.

**Tegen melige koolluis (*Brevicoryne brassicae*) (enkel bij spruitkool)**: 0,2 L/ha, 1 toepassing. Een wachttijd van 7 dagen voor de oogst respecteren.

## 2-6 - RODE BIET (krotten) (open lucht)

### STADIUM:

CLOSER toepassen vanaf begin wortel- of knolontwikkeling (diameter > 0,5 cm) (> BBCH 41)

### DOSIS:

**Tegen bladluis (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)** : 0,2 L/ha, 1 toepassing. Een wachttijd van 28 dagen voor de oogst respecteren.

Dow AgroSciences is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de teelt van rode biet. Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

## 2-7 - SLASOORTEN en SPINAZIE (open lucht en onder bescherming)

### STADIUM open lucht:

CLOSER toepassen vanaf rozet 30% variëteitspecifieke grootte bereikt (> BBCH 33).

### DOSIS:

**Tegen bladluis (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)** : 0,2 L/ha, 1 toepassing. Een wachttijd van 7 dagen voor de oogst respecteren.

Dow AgroSciences is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de teelt van slasoorten en spinazie. Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

## 2-8 - CICHOREI (open lucht) en WITLOOFWORTELTEELT (open lucht)

### STADIUM:

CLOSER toepassen vanaf begin wortelontwikkeling (diameter > 0,5 cm) (> BBCH 41).

### DOSIS:

**Tegen bladluis (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)** : 0,2 L/ha, 1 toepassing. Een wachttijd van 28 dagen voor de oogst respecteren.

Dow AgroSciences is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de teelt van chicorei en witloofwortelteelt. Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

## 3 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Voor aardappelen, aardappelootgoed, bataat, viciabonen, kolen, rode biet, slasoorten, spinazie, chicorei en witloofwortelteelt: minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

## 4 - ANTIREZISTENTIE STRATEGIE

Om resistentie te voorkomen, raadt Dow AgroSciences aan de aanbevolen dosis te respecteren en het maximaal aantal bespuitingen met CLOSER niet te overschrijden.

De maximaal erkende dosis toepassen in geval van menging met insecticiden die voor de bestrijding van een andere plaag worden ingezet.

## 5 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet schoongemaakt worden met water na gebruik van CLOSER.

## 6 - VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P391 Gelekte / gemorste stof opruimen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPo Na de behandeling de percelen / oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

SPe8 Gevaarlijk voor bijen en andere bestuivende insecten. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen. Het product moet dus toegepast worden vroeg in de morgen of laat in de avond. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid.

SPa1 Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 4C.

## 7 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

## 8 - EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

### NA INSLIKKEN :

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### NA INADEMING :

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### BIJ CONTACT MET DE HUID :

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie : een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### BIJ CONTACT MET DE OGEN :

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie : een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245 of SGS (Nederlands): **+32 3 575 0330**.

## GARANTIE

Le fabricant n'est pas responsable des risques de stockage, de la manipulation ou de l'efficacité de l'insecticide CLOSER™ puisqu'il n'a aucun contrôle sur ceux-ci. Le fabricant garantit exclusivement la composition et le contrôle de qualité du produit qui est légalement autorisé à la vente et qui correspond à la formule mentionnée sur l'étiquette.

## EMBALLAGE VIDE ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage vide de ce produit doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fosses avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



www.agrirecover.eu

## MODE D'EMPLOI

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai(s) d'attente. Bien que cette remarque générale s'applique à la plupart des produits de protection des plantes, Corteva Agriscience veut souligner que la diminution de la dose d'un insecticide peut favoriser l'apparition de la résistance.

## 1 - CULTURES AGREES

Tomate (sous protection)  
Aubergine et pépinos (sous protection)  
Poivron / piment (sous protection)  
Concombre (sous protection)  
Chayotte (sous protection)  
Cornichon (sous protection)  
Courgette / patisson (sous protection)  
Melon, pastèque et potiron (sous protection)  
Plantes ornementales (non destinées à la consommation) (sous protection)  
Pommes de terre et culture de plants de pommes de terre (plein air)  
Patate douce (plein air)

Fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse) (plein air)  
Choux : chou brocoli, chou-fleur (blanc et vert), chou de Bruxelles, choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de savoie), chou de Chinois, pakchoï, pakchoï en rosette et komatsuna (plein air)  
Betterave rouge (plein air)  
Laitues (sous protection et plein air)  
Epinard (sous protection et plein air)  
Chicorée (plein air)  
Culture de racines de witloof (plein air)

## 2 - DOSES et CONSEILS D'APPLICATION

### 2-1 - TOMATE, AUBERGINE & PÉPINOS, POIVRON / PIMENT, CONCOMBRE, CHAYOTTE, CORNICHON, COURGETTE / PATISSON, MELON, POTIRON, PASTÈQUE (sous protection)

#### STADE :

Appliquer CLOSER entre la première pousse latérale primaire et apicale est visible et 70% des fruits ont la coloration typique du fruit à maturité (BBCH 21-87).

#### DOSE :

Appliquer CLOSER 1 ou 2 fois avec 7 jours d'intervalle.

**CULTURE VERTICALE (tomate, aubergine & pépinos, poivron / piment, concombre, chayotte, cornichon, courgette / patisson, melon, pastèque) :** Max. 0,16 L/ha de haie / culture.

**Contre pucerons (*Aphididae*) :** 0,08 L/ha de haie, 1-2 applications à intervalle d'au moins 7 jours.

**Contre mouches blanches / aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*) :** soit 1-2 traitements avec 0,08 L/ha de haie avec un intervalle minimum de 7 jours, soit 1 traitement avec 0,16 L/ha de haie.

**CULTURE HORIZONTALE (cornichon, courgette / patisson, melon, potiron, pastèque) :** Max. 0,4 L/ha/culture.

**Contre pucerons (*Aphididae*) :** 0,2 L/ha, 1-2 applications à intervalle d'au moins 7 jours.

**Contre mouches blanches / aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*) :** soit 1-2 traitements avec 0,2 L/ha avec un intervalle minimum de 7 jours, soit 1 traitement avec 0,4 L/ha.

Respecter un délai avant récolte de 1 jour.

Dow AgroSciences ne sera pas tenu responsable pour tout dégât éventuel occasionné à la culture de pastèque et chayotte. Afin d'éviter des dommages aux cultures, il est conseillé de faire un test sur certaines plantes avant de traiter tout le champ.

### 2-2 - PLANTES ORNEMENTALES (non destinées à la consommation) (sous protection)

#### STADE :

Appliquer CLOSER entre le stade de 2 feuilles et les premiers pétales floraux sont visibles (la fleur est encore fermée) (BBCH 12-59).

#### DOSE :

Appliquer CLOSER 1 à 2 fois avec 7 jours d'intervalle.

Dose maximale 0,04 L/100 L/culture.

L'utilisation en plantes ornementales est accordée sur base d'essais réalisés sur les espèces suivantes : *Bellis*, *Calendula*, *Chrysanthemum*, *euphorbia*, *Geranium*, *Gerbera*, *Lantana* et *Nicotiana*. Il est conseillé de faire une pulvérisation test sur un nombre limité de plantes si aucune expérience n'a encore été acquise sur la variété ou le cultivar.

**Contre pucerons (*Aphididae*)** : 0,02 L/100 L, 1-2 applications à intervalle d'au moins 7 jours.

**Contre mouches blanches / aleurodes (*Trialeurodes vaporariorum*, *Bemisia tabaci*)** : soit 1-2 traitements avec 0,02 L/100 L avec un intervalle minimum de 7 jours, soit 1 traitement avec 0,04 L/100 L.

### 2-3 - POMMES DE TERRE et CULTURE DE PLANTS DE POMMES DE TERRE et PATATE DOUCE (plein air)

**STADE :**

Appliquer CLOSER après la floraison (< BBCH 70)

**DOSE :**

**Contre pucerons (*Aphididae*)** : 0,2 L/ha, 1 à 2 applications à intervalle d'au moins 21 jours. Respecter un délai avant récolte de 7 jours.

Dow AgroSciences ne sera pas tenu responsable pour tout dégât éventuel occasionné à la culture de patate douce. Afin d'éviter des dommages aux cultures, il est conseillé de faire un test sur certaines plantes avant de traiter tout le champ.

### 2-4 - FÈVES et FÈVEROLES (récoltées fraîches, sans cosse) (plein air)

**STADE :**

Appliquer CLOSER entre le stade les boutons floraux sont formés mais toujours enveloppés par des feuilles et le stade les premiers pétales et de nombreux boutons floraux individuels toujours fermés sont visibles (BBCH 50-59), mais ne pas appliquer moins de 6 jours avant le début de la floraison ou appliquer après la floraison (> BBCH 70). Au maximum 2 applications par culture à intervalle de 21 jours.

**DOSE :**

**Contre pucerons (*Aphididae*)** : 0,2 L/ha, 1 à 2 applications à intervalle de 21 jours. Respecter un délai avant récolte de 14 jours pour les applications après la floraison.

Dow AgroSciences ne sera pas tenu responsable pour tout dégât éventuel occasionné à la culture des fèves et féveroles. Afin d'éviter des dommages aux cultures, il est conseillé de faire un test sur certaines plantes avant de traiter tout le champ.

### 2-5 - CHOU BROCOLI, CHOU-FLEUR (blanc et vert), CHOU DE BRUXELLES, CHOUX POMMÉS (blanc, rouge, chou cabus et chou de savoie), CHOU CHINOIS, PAKCHOÏ, PAKCHOÏ EN ROSETTE et KOMATSUNA (plein air)

**STADE :**

**Chou brocoli** : Appliquer CLOSER entre le stade 1 pousse latérale visible et le stade les têtes ont atteint leur forme et taille typiques et elles sont fermées (BBCH 21-49).

**Chou-fleur (blanc et vert)** : Appliquer CLOSER entre le stade les boutons floraux de la tige se développent, largeur > 1 cm et le stade les têtes ont atteint leur forme et taille typiques et elles sont fermées (BBCH 41-49).

**Chou de Bruxelles** : Appliquer CLOSER entre le stade la tige principale a atteint 10% de sa taille finale dépendant de la variété et le stade les choux en-dessous de la pousse terminale sont étroitement fermés (BBCH 31-49).

**Choux pommés (blanc, rouge, chou cabus et chou de savoie) et chou Chinois, pakchoï, pakchoï en rosette et komatsuna** : Appliquer CLOSER entre le stade début de la formation des têtes, les 2 feuilles les plus jeunes ne se déroulent pas et le stade les têtes ont atteint leur grandeur, forme et dureté typiques (BBCH 41-49).

**DOSE :**

**Contre pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)** : 0,2 L/ha, 1 application. Respecter un délai avant la récolte de 7 jours.

**Contre puceron cendré du chou (*Brevicoryne brassicae*) (seulement pour chou de bruxelles)** : 0,2 L/ha, 1 application. Respecter un délai avant la récolte de 7 jours.

### 2-6 - BETTERAVE ROUGE (plein air)

**STADE :**

Appliquer CLOSER à partir que les racines ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0,5 cm) (> BBCH 41)

**DOSE :**

**Contre pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)** : 0,2 L/ha, 1 application. Respecter un délai avant la récolte de 28 jours.

Dow AgroSciences ne sera pas tenu responsable pour tout dégât éventuel occasionné à la culture de betterave rouge. Afin d'éviter des dommages aux cultures, il est conseillé de faire un test sur certaines plantes avant de traiter tout le champ.

### 2-7 - LAITUES et EPINARD (plein air et sous protection)

**STADE plein air :**

Appliquer CLOSER à partir que la rosette a atteint 30% de sa taille dépendant de la variété (> BBCH 33)

**DOSE :**

**Contre pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)** : 0,2 L/ha, 1 application. Respecter un délai avant la récolte de 7 jours.

Dow AgroSciences ne sera pas tenu responsable pour tout dégât éventuel occasionné à la culture de laitues et épinards. Afin d'éviter des dommages aux cultures, il est conseillé de faire un test sur certaines plantes avant de traiter tout le champ.

### 2-8 - CHICOREE et CULTURE DE RACINES DE WITLOOF (plein air)

**STADE :**

Appliquer CLOSER à partir que la racine commence à se développer (diamètre > 0,5 cm) (> BBCH 41)

**DOSE :**

**Contre pucerons (*Aphididae*, *Lachnidae*, *Callaphididae*)** : 0,2 L/ha, 1 application. Respecter un délai avant la récolte de 28 jours.

Dow AgroSciences ne sera pas tenu responsable pour tout dégât éventuel occasionné à la culture de chicorée et culture de racines de witloof. Afin d'éviter des dommages aux cultures, il est conseillé de faire un test sur certaines plantes avant de traiter tout le champ.

### 3 - MESURES DE RÉDUCTION DU RISQUE

Pour pommes de terre, la culture de plants de pommes de terre, patate douce, les fèves et féveroles (récoltées fraîches, sans cosse), les choux, betterave rouge, laitues, épinard, chicorée et culture de racines de witloof : zone tampon minimale de 1m avec technique classique.

En plus des zones tampons mentionnées, des zones régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.

### 4 - STRATEGIE ANTI-RESISTANCE

Afin d'éviter l'apparition de résistance, Dow AgroSciences recommande de respecter la dose conseillée et de ne pas dépasser le nombre limite d'applications avec CLOSER. Appliquer la dose maximale agréée en cas de mélange avec des insecticides destinés à combattre d'autres insectes.

### 5 - NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR

Il faut nettoyer correctement avec d'eau le pulvérisateur après l'utilisation de CLOSER.

### 6 - CONSEILS DE PRUDENCE

- P280 Porter des gants de protection et des vêtements de protection.  
P391 Recueillir le produit répandu.  
SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage  
SPo Ne pas pénétrer dans des cultures / surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.  
SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).  
SPe8 Dangereux pour les abeilles et les autres insectes pollinisateurs. Pour protéger les abeilles et les autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer ce produit durant la floraison de la culture. Le produit doit être appliqué tôt le matin ou tard le soir. Ne pas appliquer lorsque des adventices en fleur sont présentes.  
SPa1 Pour éviter le développement de résistance, alternez l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code IRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 4C

### 7 - CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

### 8 - CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

#### EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

#### EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

#### EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

#### EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245 ou SGS (Français) : **+32 474 555 786**

## VORSICHTSMAßNAHMEN

- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung tragen.
- P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
- SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPo Behandelte Flächen / Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.
- SPe3 Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten (siehe Anwendungseinschränkungen, Pufferzone).
- SPe8 Gefährlich für Bienen und andere bestäubende Insekten. Um Bienen und andere bestäubende Insekten zu schützen, verwenden Sie das Produkt nicht während der Blüte der Kulturpflanzen. Das Produkt muss früh morgens oder spät abends angewendet werden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von blühenden Unkräutern.
- SPa1 Um Resistenzaufbau zu vermeiden, wechseln Sie die Verwendung dieses Produkt mit anderen Produkten mit einer anderen Wirkungsweise ab. Der IRAC-Code für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts ist 4C

Copy