



R 22,0



Dow AgroSciences

Capri Duo®

HERBICIDE

SELECTIEF HERBICIDE TEGEN EENJARIGE GRASSEN EN BREEDBLADIGEN

Wintergranen : tarwe, rogge, triticale, spelt

Zeer werkzaam tegen duist, windhalm, raai gras, klee kruid, kamille, muur, akkerviooltje, ereprijssoorten en kruisbloemige onkruiden

HERBICIDE SELECTIF CONTRE LES GRAMINEES ANNUELLES ET DICOTYLEES

Céréales d'hiver : froment, seigle, triticale, épeautre

Très efficace contre vulpin, jouet du vent, ray-grass, gaillet gratteron, matricaire, mouron, pensée, véroniques et crucifères

1 KG e HDPE

Bevat : WG - waterdispergeerbaar granulaat op

basis van 70,8 g/kg pyroxsulam (= 7,1 %) + 14,2 g/kg florasulam (= 1,4 %) + 70,8 g/kg cloquintocet-mexyl (= 7,1 %)

Contient : WG - granulés à disperser dans l'eau à base de 70,8 g/kg pyroxsulam (= 7,1 %) + 14,2 g/kg florasulam (= 1,4 %) + 70,8 g/kg cloquintocet-mexyl (= 7,1 %)

Dow AgroSciences B.V.

Sneeuwbeslaan 20 – bus 10

B-2610 Wilrijk, België

Tel : 03 450 27 00

Website : www.dowagro.be

Familie/Famille : sulfonamiden (HRAC B)/ sulfonamides (HRAC B)

Erkenningsnummer/Numéro d' autorisation : 9900P/B

Partijnummer: zie op de bus/No de lot : voir sur le flacon

Product bestemd voor beroepsgebruik/Produit destiné à un usage professionnel

ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTIPOISONS :

070/245.245

® Registered Trademark of Dow AgroSciences LLC

GEVARENPICTOGRAMMEN / PICTOGRAMMES DE DANGER

SIGNAALWOORD : WAARSCHUWING / MENTION D'AVERTISSEMENT : ATTENTION

GEVARENAANDUIDINGEN / MENTIONS DE DANGER

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen / Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



GHS09

P110063291709

WAARBORG

De fabrikant is niet aansprakelijk voor risico's die voortvloeien uit het opslaan, gebruik en verwerken van CAPRI DUO® aangezien deze buiten zijn controle liggen. De fabrikant garandeert uitsluitend de samenstelling en de kwaliteit van het product dat wettelijk is toegelaten en overeenstemt met de formulering vermeld op het etiket.

LEDIGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

De ledige verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (3 opeenvolgende malen schudden met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Spuitoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten noch met het middel, noch met de verpakking vervuilen. De verpakking in geen geval herbruiken voor een ander doel. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.



www.agrirecover.eu

WERKINGSSPECTRUM**Zeer gevoelige eenjarige grassen**

Dravik (tot begin uitstoeling)
Druif
Raai gras
Straat gras (tot begin uitstoeling)
Wilde haver
Windhalm

Zeer gevoelige eenjarige breedbladigen

Akkerviooltje
Ereprijssoorten
Kamille
Klaproos (jong stadium)
Kleefkruid
Kruisbloemigen
Muur
Ooievaarsbek
Schermbloemigen

Weinig gevoelige en ongevoelige onkruiden

Dovenetels
Duivenkervel

HOE GEBRUIKEN

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

1 - ERKENDE TEELTEN

Wintergranen: tarwe, rogge, triticale, spelt.

2 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING IN WINTERGRANEN : TARWE, ROGGE, TRITICALE, SPELT (OPEN LUCHT)

STADIUM

Toepassen in de lente vanaf het stadium begin uitstoeling – eerste knoop (BBCH 21-31).

Voor een optimaal resultaat wordt best behandeld tussen 15 maart en 15 april.

De latere toepassingen kunnen onvoldoende werkzaamheid vertonen.

DOSIS

MAXIMALE DOSIS: 265 g CAPRI DUO/ha bij aanwezigheid van éénjarige grassen.
170-210 g CAPRI DUO/ha als er enkel éénjarige breedbladigen aanwezig zijn.

Maximaal 1 toepassing/teelt.

Op resistente duist moet steeds de volle dosis worden toegediend.

CAPRI DUO moet steeds toegepast worden in menging met een erkende geësterde koolzaadolie aan een dosis van 1L/ha.

Niet toepassen met vloeibare stikstof. Een interval van 7 dagen moet gerespecteerd worden tussen de toepassing van CAPRI DUO en het toedienen van vloeibare stikstof.

3 - WEERSOMSTANDIGHEDEN

Niet spuiten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, 's avonds spuiten.



Einde van de behandeling

<= 1 uur =>



regen

4 - ANTI-RESISTENTIE STRATEGIE

Pyroksulam en florasulam zijn herbicides met een ALS inhibitor (acetolactaat synthase inhibitor) werkingsmechanisme ingedeeld als HRAC B.

5 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Altijd minimum 50% driftreducerende techniek gebruiken over het volledige veld en een bufferzone van 1 m respecteren tussen het veld en het oppervlaktewater.

6 - VERVANGTEELTEN

In geval van gewasmislukking kunnen volgende gewassen vanaf 6 weken na de toepassing heringezaaid worden : graangewassen, maïs, raaigras.

Geen bieten, aardappelen, bonen, cichorei, spinazie, rapen of uien planten als vervanggewas. Volgende teelten zijn mogelijk binnen een normale rotatie : tarwe, gerst, triticale, maïs, haver, erwten, bonen, raaigras, bieten, aardappelen, planten van koolgewassen en koolzaad. Tijdens een droge zomer kan evenwel een tijdelijke vermindering van de stevigheid worden vastgesteld bij de teelt van koolzaad.

7 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel **moet onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van CAPRI DUO, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

TE VOLGEN STAPPEN BIJ HET REINIGEN

Ledig het spuittoestel volledig op het behandeld veld. Ledig zowel het spuitvat, de spuitarmen als de leidingen. Er blijft ongeveer 30 L restvloeistof achter in de leidingen van een spuittoestel met een capaciteit van 1000 L. Reinig onmiddellijk de inwendige en de uitwendige wanden van het spuittoestel met een hogedrukspuit in geval van polyethyleen of metaalachtige tank of een tuinslang. Met de hoge druk is er minder water vereist dan met de klassieke methode zonder druk.

Vul daarna het spuitvat met een oplossing die 0,3 L huishoudammoniak van 20% bevat per 100 L water. Indien het toestel met hoge druk werd gereinigd, vul het vat voor $\frac{1}{4}$; indien het met de tuinslang werd gereinigd, vul het vat dan voor de helft of volledig. Zet het roersysteem aan en laat het product inwerken gedurende 15 minuten. Ledig daarna het spuitvat en de spuitarmen en reinig met proper water. In alle gevallen, steeds de spuitdoppen en de filters demonteren en grondig reinigen in een emmer met goede afwaszeep. Het spoelwater verspreiden over de behandelde teelt.

8 - VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- P280 Beschermende handschoenen dragen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
SPo Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.
SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie risicobeperkende maatregelen).
Spe3 Om niet doelwitplanten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).

9 - AANVULLENDE INFORMATIE

- EUH208 Bevat pyroxsulam en cloquimocet-mexyl. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

10 - EERSTEHULPMAATREGELEN EN AANWIJZINGEN VOOR DE ARTS

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen.

Het ANTIGIFCENTRUM (tel. 070/245.245) of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM (tel. 070/245.245) of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken.

Met veel water wassen.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum 070/245.245

GARANTIE

Le fabricant n'est pas responsable des risques de stockage, de l'utilisation et de la manipulation de CAPRI DUO® puisqu'il n'a aucun contrôle sur ceux-ci. Le fabricant garantit exclusivement la composition et le contrôle de qualité du produit qui est légalement autorisé à la vente et qui correspond à la formule mentionnée sur l'étiquette.

EMBALLAGE VIDE ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage vide de ce produit doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur au point de ramassage prévu à cet effet.

Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser ceux-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fosses avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



www.agrirecover.eu

SPECTRE D'ACTIVITE

Graminées annuelles très sensibles

Brome (jusqu'au stade début tallage)

Folle avoine

(jouet) du vent

Pâturin (jusqu'au stade début tallage)

Ray-grass

Vulpin

Dicotylées annuelles très sensibles

Coquelicot (stade jeune)

Crucifères

Gaillet gratteron

Géranium

Matricaire

Mouron

Ombellifères

Pensée

Véroniques

Mauvaises herbes peu sensibles et insensibles

Fumeterre

Lamiers

MODE D'EMPLOI

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par minidoses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

1 - CULTURES AGREES

Céréales d'hiver : froment, seigle, triticale et épeautre.

2 - DOSES ET STADES D'APPLICATION EN CEREALES D'HIVER : FROMENT, SEIGLE, TRITICALE, EPEAUTRE (PLEIN AIR)

STADE

Traiter au printemps à partir du stade début tallage jusqu'au premier nœud (BBCH 21-31).

Pour obtenir un résultat optimal, il faut de préférence traiter entre 15 mars et 15 avril.

Des applications plus tardives peuvent montrer une efficacité insuffisante.

DOSE

DOSE MAXIMALE: 265 g CAPRI DUO/ha en présence de graminées annuelles.
170-210 g CAPRI DUO/ha si seulement dicotylées annuelles.

Maximum 1 application par culture.

Sur le vulpin résistant, la dose la plus élevée doit être utilisée.

CAPRI DUO doit toujours être appliqué en mélange avec une huile de colza estérifiée agréée à cet effet à la dose de 1 L/ha.

Ne pas appliquer avec de l'azote liquide. Un intervalle de 7 jours doit être respecté entre une application avec CAPRI DUO et l'addition d'azote liquide.

3 - CONDITIONS CLIMATIQUES

Ne pas appliquer avec un vent venant du nord ou de l'est. Par temps chaud appliquer de préférence le soir.



Fin du traitement

<= 1 heure =>



pluie

4 - STRATEGIE ANTI-RESISTANCE

Pyroxsulame et florasulame sont des herbicides à mode d'action ALS inhibiteur (acétolactate synthase inhibiteur) classifié comme HRAC B.

5 - MESURES DE REDUCTION DU RISQUE

Toujours utiliser une technique réduisant la dérive de minimum 50 % lors du traitement et respecter une zone tampon de 1 m entre la parcelle traitée et les points d'eau.

6 - CULTURE DE REMPLACEMENT

En cas d'échec de la culture, il est de nouveau possible de semer les cultures de remplacement suivantes à partir de 6 semaines après l'application: céréales, maïs, ray-grass.

Ne pas implanter de betteraves, pommes de terre, haricots, chicorée, épinard, navet et oignons comme culture de remplacement. Les cultures suivantes sont possibles dans une rotation normale : froment, orge, triticale, maïs, avoine, pois, haricots, ray-grass, betteraves, pommes de terre, culture de choux repiqués et colza. Cependant, en cas d'été sec, une réduction de vigueur peut-être observée temporairement sur la culture de colza.

7 - NETTOYAGE DU PULVERISATEUR

Il faut nettoyer à fond le pulvérisateur immédiatement après l'utilisation de CAPRI DUO pour éviter tous dégâts dans les cultures sensibles pulvérisées à la même époque avec le même pulvérisateur.

SUITE DES OPERATIONS

Vider la cuve complètement sur la terre traitée. Vidanger la cuve, les rampes et les canalisations. Il reste environ 30 L de bouillie dans les canalisations par 1000 L de capacité de la cuve. Immédiatement nettoyer intégralement les parois extérieures et intérieures du pulvérisateur soit avec les têtes rotatives de nettoyage dans la cuve soit avec un appareil à haute pression soit au tuyau d'arrosage. La haute pression sera réservée aux cuves en polyéthylène ou en métal exclusivement. La haute pression nécessite beaucoup moins d'eau que la méthode classique sans

pression. Il faudra ensuite remplir la cuve partiellement avec une solution contenant 0.3 L d'ammoniaque du commerce à 20% par 100 L d'eau.

Mettre l'agitation en marche et laisser agir pendant 15 minutes. Vidanger la cuve et les rampes et rincer à l'eau claire. Dans tous les cas, démonter les buses et les filtres et les nettoyer à fond dans un seau contenant un bon savon de vaisselle. Epandre les eaux de rinçage dans les terres traitées.

8 - CONSEILS DE PRUDENCE

- P280 Porter des gants de protection.
P391 Recueillir le produit répandu.
SPo Ne pas pénétrer dans les cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.
SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respectez une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures de réduction du risque).
SPe3 Pour protéger les plantes non-ciblées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque).

9 - INFORMATIONS ADDITIONNELLES

- EUH208 Contient pyroxsulam et cloquintocet-mexyl. Peut produire une réaction allergique.
EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

10 - PREMIERS SOINS ET INDICATIONS POUR LE MEDECIN

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS (tél. 070/245.245) ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS (tél. 070/245.245) ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés.

Laver abondamment à l'eau.

En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

