

# Boa™

## HERBICIDE

**GROUP 2 HERBICIDE**

### HERBICIDE IN WITLOOFWORTELTEELT, CICHOREI & DRUIVELAARS HERBICIDE EN CULTURE DE RACINES DE WITLOOF, CHICORÉE, VIGNES et SORGHO (LUX)

Bevat: 20 g/L penoxsulam, OD – olie-dispersie  
Contient: 20 g/L penoxsulam, OD – Dispersion huileuse

Erkenningsnummer/Numéro d'agrément : 10848P/B  
Numéro d'agrément : L02225-208

Partijnummer : zie op de bus/No de lot : voir sur le flacon  
Product bestemd voor beroepsgebruik/Produit destiné à un usage professionnel

™ Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

#### Toelatingshouder:

Corteva Agriscience Netherlands B.V.  
Zuid-Oostsingel 24D  
4611BB Bergen op Zoom  
Nederland  
Website: www.corteva.be

ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTI-POISONS 070/245.245  
POUR LE G.-D . DU LUXEMBOURG : (+352) 8002 5500



UF: WDY2-R076-100C-KEE4



GHS07

#### GEVARENAANDUIDINGEN

- H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

- P261 Inademing van damp en spuitnevel vermijden.  
P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming.  
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.  
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen gedurende ten minste 15 minuten.  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoljen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.  
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

#### AANVULLENDE INFORMATIE

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



GHS09

#### MENTIONS DE DANGER

- Provoque une irritation cutanée.  
Peut provoquer une allergie cutanée.  
Provoque une grave irritation oculaire.  
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### CONSEILS DE PRUDENCE

- Eviter de respirer les vapeurs et brumes de pulvérisation.  
Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux.  
Recueillir le produit répandu.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau pendant minimum 15 minutes.  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

#### INFORMATION ADDITIONELLES

- Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG

#### GEFAHRENHINWEISE


- Verursacht Hautreizungen.  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
Verursacht schwere Augenreizung.  
Sehr giftig für Wasserorganismen, Langzeitwirkung.

#### SICHERHEITSHINWEISEN

- Einatmen von Dampf / Nebel vermeiden.  
Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz tragen.  
Verschüttete Mengen aufnehmen  
BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen für mindestens 15 Minuten.  
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
Bei Hautreizung oder -Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.

#### SONSTIGE ANGABEN

- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.



0277668



2212

1LE

## LEGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden (3 opeenvolgende malen schudden met water). Het bekomen spoelwater ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelingspunt.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.



www.agrirecover.eu

## WERKINGSSPECTRUM

### (Zeer) gevoelige breedbladigen

Herderstasje  
Knopkruid  
Kamille  
Varkenskers (grote en kleine)  
Zwarte nachtschade  
Kruiskruid

### Weinig gevoelige en ongevoelige breedbladigen

Tweejarige alsem  
Hondspeterselie

## GEBRUIKSAANWIJZING

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

**Non-printed area on page 2 ONLY  
(on the back of 2D code area printed  
on the front page)**

## 1 - ERKENDE TEELTEN

Witloofwortelteelt (open lucht)  
Cichorei (open lucht)  
Druivelaars (tafeldruiven + voor wijnproductie) (open lucht)

## 2 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING

Toepassingstechniek: bespuiting.

### 2-1 - IN WITLOOF EN CICHOREI

#### STADIUM

BOA™ kan toegepast worden vanaf droog zaad tot en met het '5 -bladstadium' van het gewas (BBCH 00-15).

#### DOSIS

Max 0,75 L/ha

Bij een zware aantasting of bij ontwikkelde onkruiden is het aangeraden te behandelen vanaf het '2-bladstadium' van het gewas en vervolgens een gefractioneerde behandeling toe te passen van 3 behandelingen met een maximale dosis van 0,25 L/ha per toepassing. Indien met de eerste behandeling kan gewacht worden, bij voorkeur 2 behandelingen met een maximale dosis van 0,375 L/ha per toepassing uitvoeren. Een interval van 7 dagen respecteren tussen de behandelingen.

Aanbevolen dosis bij fractionatie:

Stadium witloof en cichorei	BBCH 12	BBCH 13-14	BBCH 15
3 behandelingen*	0,250 L/ha	0,250 L/ha	0,250 L/ha
2 behandelingen*	--	0,375 L/ha	0,375 L/ha

\* 0,75 L/ha/jaar niet overschrijden = 15 g a.s./ha/jaar

BOA™ kan toegepast worden op alle variëteiten witloof/cichorei, zelfs de ALS gevoelige.

Symptomen van vergeling, vervorming of vertraging van de groei van het gewas kunnen mogelijk voorkomen 2 tot 3 weken na de behandeling met BOA™. Deze zijn tijdelijk, zullen uiteindelijk verdwijnen en hebben geen invloed op de opbrengst of de kwaliteit.

### 2-2 - IN DRUIVELAARS (tafeldruiven + voor wijnproductie)

#### STADIUM

BOA™ gebruiken pré en post-knopperiode tussen vegetatierust (winterrogen spits tot rondbogen, al naar gelang de druivensoort helder tot donkerbruin. Schubben van de knop, al naar gelang de druivensoort, meer of minder gesloten) en stadium waar de bessen zo groot zijn als erwten, druiven hangen (BBCH 00-75).

Het is aangeraden BOA™ te combineren met een ander herbicide dat een anti-kiemende werking bevat om zo het werkingsspectrum te vergroten en de werking te verlengen en/of een bladherbicide met na-opkomst werking om de aanwezige onkruiden bij behandeling te bestrijden.

BOA™ aan een dosis van 0,75 L/ha heeft een selectieve werking bij alle wijnvariëteiten van minstens 4 jaar oud, zonder een restrictie betreffende de bodem. Jonge uitlopers moeten 30-40 cm afgedekt worden.

#### DOSIS

0,75 L/ha, max. 1 toepassing /12 maanden.

## 3 - WEERSOMSTANDIGHEDEN

BOA™ is weinig gevoelig aan weersomstandigheden tijdens de toepassing (temperatuur en luchtvochtigheid). Een uur tussen de behandeling en regen is noodzakelijk voor een goede opname van het product.



Einde behandeling

<=

60 minuten

=>

regen



## 4 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

## 5 - WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE VOLGGEWASSEN

Om overschrijding van de MRL te voorkomen, moet een wachtermijn van minstens 90 dagen gerespecteerd worden tussen de laatste toepassing en het zaaien of planten van volggewassen.

In de herfst kunnen na een behandeling met BOA™ volgende teelten ingezaaid worden in het kader van een normaal rotatieschema na witloof of cichorei: tarwe, durumtarwe, gerst en tijdelijk grasland met raaisgras.

In de daaropvolgende lente kunnen na witloof of cichorei alle graangewassen ingezaaid worden.

Geen groenten- of sierteeltgewassen na cichorei en witloof.

## 6 - REINIGING VAN HET SPUITOESTEL

Het spuittoestel moet **onmiddellijk** en **grondig** schoongemaakt worden na gebruik van BOA™, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

- Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

## 7 - OVERIGE AANBEVELINGEN

- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 2.
- SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo Na de behandeling de percelen/ oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

## 8 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

## 9 - EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

### **NA INSLIKKEN:**

De mond spoelen.

Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### **NA INADEMING:**

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

### **BIJ CONTACT MET DE HUID:**

Verontreinigde kleding uittrekken.

Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### **BIJ CONTACT MET DE OGEN:**

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Spoel WEG van het niet-aangetaste oog.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum **070/245.245** of SGS (Nederlands):

**+32 3 575 0330.**

## AANSPRAKELIJKHEID

Corteva™Agriscience is niet aansprakelijk voor risico's die voortvloeien uit het opslaan, gebruik en verwerken van BOA™ aangezien deze buiten zijn controle liggen. Corteva™Agriscience garandeert uitsluitend de samenstelling en de kwaliteit van het product dat wettelijk is toegelaten en overeenstemt met de formulering vermeld op het etiket.

## EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives). Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



[www.agrirecover.eu](http://www.agrirecover.eu)

## SPECTRE D'ACTIVITE

### Dicotylées (très) sensible

Capselle bourse à pasteur  
Galinsoge  
Camomille  
Repousses de colza  
Senebière corne-de-cerf et senebière didyme  
Séneçon  
Morelle noire

### Dicotylées peu à très peu sensibles

Armoise commune  
Ethuse ciguë

## MODE D'EMPLOI

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

## 1 - CULTURES AGREES

Culture de racines de witloof (plein air)  
Chicorée (plein air)  
Vigne (raisins de table + pour production de vin) (plein air)  
Sorgho (ensilage + grain) (seulement pour Luxembourg)

## 2 - DOSES ET STADES D'APPLICATION

Méthode d'application: Pulvérisation.

### 2-1 - EN WITLOOF et CHICORÉE

#### STADE:

BOA™ s'applique du stade semence sèche jusqu'au stade '5 feuilles' (BBCH 00-15)

#### DOSE

Max 0,75 L/ha

En cas de forte infestation ou de stade avancé des adventices, il est conseillé de traiter dès le stade '2 feuilles' de la culture et d'appliquer alors un programme avec trois applications de 0,25 L/ha au maximum par passage; lorsque la première application peut attendre, préférer alors le programme à deux applications de 0,375 L/ha au maximum par passage. Les applications se feront en respectant un intervalle de 7 jours entre deux applications.

Fractionnement de dose conseillé :

Stade des chicorées & witloof	BBCH 12	BBCH 13-14	BBCH 15
3 applications*	0,250 L/ha	0,250 L/ha	0,250 L/ha
2 applications*	--	0,375 L/ha	0,375 L/ha

\* 0,75 L/ha/an étant la dose maximale à ne pas dépasser soit un apport maximum de 15 g a.s./ha/an

BOA™ peut s'utiliser sur toutes les variétés de witloof/ chicorée, même celles sensibles aux ALS.

Des symptômes de jaunissement, de déformation ou de ralentissement de croissance des cultures de chicorées/witloof peuvent survenir dans les deux ou trois semaines suivant l'application de BOA™. Ils disparaissent par la suite et sont sans effet sur le rendement de la culture et la qualité de la production de chicons.

### 2-2 - EN VIGNE (raisins de table + pour production de vin)

#### DOSE

0,75 L/ha, 1 application/12mois.

#### STADE

BOA™ est utilisable en pré et post-débourrement entre bourgeon d'hiver (période d'hiver (dormance) stade de repos, œil presque entièrement recouvert par deux écailles brunâtres. Les bourgeons sont pointus à arrondis selon les cépages) et le stade du développement des baies (les baies atteignent 50% de leur taille finale, soit la grosseur d'un petit pois. Les grappes basculent et prennent la forme typique du cépage (BBCH 00-75).

Il est conseillé d'associer BOA™ à un autre herbicide à action antigerminative afin d'élargir son spectre d'action et prolonger sa durée d'action et/ou à un herbicide foliaire de post levée afin d'éliminer les adventices présentes lors de l'application.

BOA™ à 0,75 L/ha est sélectif de toutes les variétés de vigne plantées depuis au moins 4 ans, sans restriction de type de sol. Les jeunes pieds remplaçant les manquants devront être protégés par un manchon de 30 à 40 cm.

## 2-3 - EN SORGHO COMMUN (ensilage + grain) (seulement pour Luxembourg)

#### STADE

Dans les sorghos, BOA™ est utilisable à partir du stade '3 feuilles' et jusqu'au stade '5-6 feuilles' de la culture (ne pas traiter avant le stade '3 feuilles'). Pour obtenir un niveau d'efficacité optimale, il est préférable de traiter dès le stade 3 feuilles du sorgho sur des adventices jeunes :

- Panisses : 1 feuille à début tallage,
- Chénopodes : cotylédons à 6 feuilles.

Des symptômes de jaunissement ou de tassement des cultures de sorgho peuvent survenir dans la semaine suivant l'application de BOA™. Ils disparaissent rapidement par la suite et sont sans effet sur le rendement de la culture. Dans les sorghos, ne pas appliquer par des températures supérieures à 25°C.

#### DOSE

0,8 L/ha

## 3 - CONDITIONS CLIMATIQUES

BOA™ est peu sensible aux conditions climatiques lors de l'application (température et humidité de l'air). Un délai d'une heure sans pluie est nécessaire pour une bonne pénétration du produit dans la plante.



Fin du traitement



60 minutes



pluie

## 4 - MESURES DE REDUCTION DU RISQUE

Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.

**Luxembourg (sorgho) :** Pour protéger les plantes non-cibles, respecter une zone non traitée de 5m par rapport à la zone non cultivée adjacente. Respecter une distance d'au moins 5 m entre la surface à traiter et toute surface ou cours d'eau.

En plus des zones tampons mentionnées, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.

## 5 - AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES CULTURES SUIVANTES

Afin d'éviter un dépassement de la LMR, un délai de minimum 90 jours doit être respecté entre le dernier traitement et le semis ou la plantation de la culture suivante.

En automne, à la suite d'un traitement avec BOA™, il est possible de semer les cultures suivantes dans le cadre d'une rotation normale après chicorée ou witloof: froment d'hiver, blé dur, escourgeon, épeautre, triticale et prairie temporaire de ray-grass. Au printemps suivant la culture de chicorées ou witloof: toutes céréales.

Les cultures maraîchères et ornementales sont à exclure après une culture de chicorée ou witloof.

## 6 - DELAI AVANT RECOLTE

**Luxembourg** : Un délai de 60 jours doit être respecté pour sorgho (ensilage) et de 90 jours pour sorgho (grain).

## 7 - NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR

Le pulvérisateur doit être nettoyé **immédiatement et soigneusement** après l'utilisation de BOA™ afin d'éviter tout dommage sur les cultures sensibles traitées par la suite avec le même pulvérisateur.

- Après utilisation, tout l'appareil de pulvérisation, doit être soigneusement nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur, avec un nettoyant de cuve et de l'eau conformément à l'étiquette ou aux instructions du nettoyeur utiliser pour nettoyer la cuve. Répartir l'eau de rinçage sur la culture traitée.
- Éviter la contamination de l'eau pendant la procédure de nettoyage.

## 8 - AUTRES RECOMMANDATIONS

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage

SPa1 Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 2.

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

SPo Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

Porter toujours un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

## 9 - CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

## 10 - CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

### EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

### EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

### EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés.

Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

### EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint.

Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons **070/245.245** (pour la Belgique), **(+352) 8002 5500** (pour le G.-D. du Luxembourg) ou SGS (Français) : **+32 474 555 786**.

## RESPONSABILITÉ

Corteva™Agriscience n'est pas responsable des risques de stockage, de l'utilisation et de la manipulation de BOA™ puisqu'il n'a aucun contrôle sur ceux-ci. Corteva™Agriscience garantit exclusivement la composition et le contrôle de qualité du produit qui est légalement autorisé à la vente et qui correspond à la formule mentionnée sur l'étiquette.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Das Mittel ist für berufliche Anwendungen bestimmt.

SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.

SPa1 Um Resistenzaufbau zu vermeiden, wechseln Sie die Verwendung dieses Produkt mit anderen Produkten mit einer anderen Wirkungsweise ab. Der HRAC-Code für den Wirkmechanismus des Wirkstoffs dieses Produkts ist 2.

SPe3 Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten (siehe Anwendungseinschränkungen, Pufferzone).

SPo Nach der Behandlung sind Grundstücke/Oberflächen erst wieder begehbar, wenn die gesprühte Flüssigkeit getrocknet ist.

Tragen Sie bei der Handhabung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln immer grundlegende Schutzkleidung, die Arme und Beine bedeckt (wenn keine spezielle Schutzkleidung erforderlich ist), chemikalienbeständige Handschuhe und flüssigkeitsdichte Schuhe oder Stiefel.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Giftnotrufzentrale **070/245.245** oder SGS (Deutsch):

**+49 40 30101 575**