



Prevail™

HERBICIDE

GROUP

4

HERBICIDE

HERBICIDE IN GRASLAND-WEILAND

HERBICIDE EN PRAIRIES

Bevat : 278,99 g/L triclopyr, triethylaminezout (200 g zeq/L triclopyr) en 305,33 g/L clopyralid, triethylaminezout (200 g zeq/L clopyralid), SL – met water mengbaar concentraat

Contient : 278,99 g/L triclopyr, triethylaminezout (200 g ea/L triclopyr) en 305,33 g/L clopyralid, triethylaminezout (200 g ea/L clopyralid), SL – concentré soluble

Erkenningsnummer/Numéro d'autorisation : 10774P/B

Product bestemd voor beroepsgebruik/
Produit destiné à un usage professionnel
Partijnummer: zie op de bus/No de lot : voir sur le flacon

Toelatingshouder/Déteneur d'approbation:

Corteva Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24D, 4611 BB Bergen op Zoom, Nederland
Tel: 0031 164 444 000 • Website: www.corteva.be

Verdeler/Distributeur: Corteva Agriscience Belgium B.V.
Rue Montoyer 25, 1000 Brussel, België

ANTIGIFCENTRUM / CENTRE ANTIPOISONS :
070/245.245

™ Trademarks of Corteva Agriscience
and its affiliated companies.

5 L e

0287620

2412



LEGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden (3 opeenvolgende malen schudden met water). Het bekomen spoelwater ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.



www.agrirecover.eu

WERKINGSSPECTRUM

Zeer gevoelige onkruiden:

Paardebloem

Distels voor de vorming van de bloemstengel.

Gevoelige onkruiden:

Ridderzuring en krulzuring

Brandnetel

GEBRUIKSAANWIJZING

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximaal aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten. Alhoewel deze algemene opmerking van toepassing is voor de meeste gewasbeschermingsmiddelen, wil Corteva™ Agriscience erop wijzen dat de vermindering van de dosering van een herbicide tot de opbouw van resistentie kan leiden.

Tijdstip van toepassing is cruciaal voor een goede bestrijding van de onkruiden (en een minimale belemmering van de groei van het grasland). De behandeling moet plaatsvinden:

- wanneer gras en onkruiden in actieve groei zijn, dus bij groeizame weerscondities: Temperatuur tussen de 15 en 25 graden Celsius en een relatieve luchtvochtigheid > 70%. Toepassing bij schrale noorden- of oostenwind kan tegenvallende resultaten geven.
- wanneer de distels veel bladoppervlakte hebben zodat er ook voldoende middel in de wortels terecht komt. Melkdistels het beste bestrijden als ze in het 6-8 blad stadium zijn. Akkerdistels als ze 20-30 cm hoog zijn. In de praktijk zal dit betekenen dat ± 4 weken gewacht moet worden na een maaibeurt.

Wanneer er een grote hoeveelheid wortelstokken in de bodem aanwezig is, kan een verdere behandeling in het volgende jaar aangewezen zijn.

1 - ERKENDE TEELTEN

Grasland-weiland (open lucht)

2 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING

Maximaal 480 g triclopyr/ha/12 maanden

Toepassingstechniek: bespuiting.

STADIUM

In de herfst of in de lente.

DOSIS

1L/ha in 200 tot 400L water tegen tweezaadlobbige onkruiden (eenjarige en doorlevende). 1 toepassing. Gebruik een groter watervolume bij ver ontwikkelde onkruiden of een dichte grasbegroeiing.

3 - WEERSOMSTANDIGHEDEN

Niet behandelen bij droogte, zeer warm of zeer koud weer.



Einde van de behandeling



2 uur



regen

4 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Minimale bufferzone van 1m met klassieke techniek.

Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

5 - WAARSCHUWINGEN

Niet rollen of eggen 10 dagen vóór of 7 dagen na de behandeling.

Geen boerenkool, koolrabi, rapen of grasmengsels met klaver inzaaien binnen de 6 weken na het toepassen van PREVAIL™.

Residu in plantresten die niet volledig vergaan zijn, kan mogelijk schadelijke effecten hebben op volggewassen: erwten, bonen en andere leguminosa, wortelen en schermbloemigen, aardappelen en tomaten, sla en andere composieten en andere gewassen onder bescherming. Plant geen gevoelige planten (gezaaid in de herfst) zoals bijvoorbeeld winterbonen in hetzelfde jaar van behandeling met PREVAIL™. Wanneer gevoelige gewassen in de lente geplant

moeten worden, PREVAIL™ niet later dan eind juli toepassen in het voorgaande jaar. Goede landbouwpraktijken kunnen ervoor zorgen dat plantresten volledig vergaan zijn voordat de gevoelige gewassen geplant worden.

Geen plantmateriaal gebruiken voor compostering of mulching na behandeling met PREVAIL™.

Gebruik geen mest voor verwerking tot compost van dieren die gevoederd zijn met gewassen behandeld met PREVAIL™.

PREVAIL™ is veilig voor permanent grasland. Heel soms kan een tijdelijke vergeling van het grasland voorkomen.

Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten en niet-doelwit planten. Dit product mag daarom ook niet worden verneveld. Het is bovendien aangeraden het spuittoestel na gebruik goed te spoelen met water. Alle coniferen, en meer specifiek den en lork, zijn heel gevoelig voor spuitdrift van PREVAIL™.

6 - VEILIGHEIDSTERMIJN

Vermijd de aanwezigheid van vee tijdens de behandeling. Beweiden, maaien en inkuilen van het behandelde grasland is mogelijk vanaf 7 dagen na behandeling.

Jacobskruiskruid behandeld met PREVAIL™ is aantrekkelijker voor het vee en bevat een hogere concentratie aan toxines. Vermijd de aanwezigheid van het vee in het grasland totdat het jacobskruiskruid opnieuw aan het groeien is, of wanneer de planten volledig afgestorven zijn en er geen visueel teken meer is van afgestorven planten. Vermijd absoluut jacobskruiskruid bij hooien of inkuilen.

7 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van PREVAIL™, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

- Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

8 - OVERIGE AANBEVELINGEN

- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product is 4.
- SPe1 Om het grondwater te beschermen mag dit product of andere producten die clopyralid bevatten niet gebruikt worden tussen half oktober en half maart.
- SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

9 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd. Dit product bevat fytohormonen en moet afzonderlijk bewaard worden in een lokaal met een goede verluchting, aangezien de dampen van deze middelen kunnen inwerken op andere stoffen en zodoende schade veroorzaken aan andere teelten.

10 - EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen.

Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken.

Met veel water wassen.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Spoel WEG van het niet-aangetaste oog.

Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het

Antigifcentrum **070/245.245** of SGS (Nederlands):

+32 3 575 0330.

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoper garandeert dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Er wordt geen andere garantie gegeven, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid voor welk doel dan ook. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekkige prestaties, schade of letsel als gevolg van opslag, behandeling, toepassing, gebruik van dit product en weersomstandigheden, of het falen van dit product om resistente populaties onder controle te houden, aangezien dit buiten de controle van de verkoper ligt.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives). Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



www.agrirecover.eu

SPECTRE D'ACTIVITÉ

Adventices très sensibles

Pissenlit

Chardons des champs (avant formation de la hampe florale)

Adventices sensibles

Rumex obtus et crépu

Ortie grande

MODE D'EMPLOI

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

Bien que cette remarque générale s'applique à la plupart des produits de protection des plantes, Corteva™Agriscience veut souligner que la diminution de la dose d'un insecticide peut favoriser l'apparition de la résistance.

Traiter sur des adventices et graminées en pleine croissance active pour obtenir un bon contrôle d'une part (et éviter un freinage de la prairie d'autre part):

- Traiter par temps poussant entre 15-25°C avec une humidité relative supérieure à 70%. Un traitement par vent du Nord ou d'Est ou conditions desséchantes peuvent diminuer l'efficacité.
- PREVAIL™ s'utilise préférentiellement sur des chardons entre le stade rosette jusqu'à 20-30 cm de hauteur ou 6 à 8 feuilles pour une efficacité optimale. Après une coupe ou un pâturage intensif attendre un délai de $\pm$ 4 semaines avant la pulvérisation afin de traiter sur repousse suffisamment développée.

Sur des plantes adultes lignifiées ou en présence d'une grande quantité de semences dans le sol, un traitement supplémentaire l'année suivante peut être nécessaire.

1 - CULTURES AGRÉÉES

Prairies (plein air)

2 - DOSES ET STADES D'APPLICATION

Au maximum 480 g triclopyr/ha/12 mois.

Méthode d'application: Pulvérisation.

STADE

À l'automne ou au printemps.

DOSE

1L/ha dans 200 à 400 litres d'eau contre dicotylées (annuelles et vivaces), 1 application. Si les adventices sont développées ou la densité de l'herbe est forte, un volume d'eau plus important est conseillé.

3 - CONDITIONS CLIMATIQUES

Ne pas pulvériser lors d'une sécheresse prolongée par temps très chaud ou très froid.



Fin du traitement



2 heures



pluie

4 - MESURES DE REDUCTION DU RISQUE

Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.

En plus des zones tampons mentionnées, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.

5 - AVERTISSEMENTS

Ne pas rouler ou herser 10 jours avant ou 7 jours après l'application.

Ne pas semer du chou frisé, chou rave, navets ou un mélange de graminées et légumineuses dans les 6 semaines après l'application de PREVAIL™.

Les restes de la prairie traitée (herbe- gazon- adventices ...) peuvent encore contenir des résidus de PREVAIL™ qui ne sont pas complètement dégradés. Ils peuvent avoir un effet sur la culture suivante: pois- haricots-lupins-trèfles et autres légumineuses, carottes-panais-persil et autres ombellifères, pommes de terre, laitues, chicorées et autres composées ou cultures sous protection.

Ne pas semer des cultures sensibles (semis d'automne) p.ex. des haricots d'hiver la même année que la pulvérisation de PREVAIL™.

Le semis de cultures sensibles au printemps suivant est possible à condition que la pulvérisation ait été réalisée avant la fin juillet. Les bonnes pratiques agricoles sont recommandées afin d'accélérer la dégradation du gazon avant l'implantation de cultures sensibles.

Ne pas utiliser l'herbe traitée pour le compostage et mulching après une application de PREVAIL™.

Ne pas utiliser de fumier pour le compostage d'animaux qui ont été nourris avec les récoltes traitées avec PREVAIL™.

PREVAIL™ est très sélectif vis-à-vis des graminées. Un palissement temporaire de la prairie peut s'observer de façon occasionnelle.

Étant donné la grande sensibilité de certaines cultures à ce produit, il est nécessaire de veiller tout particulièrement à éviter tout dégât aux cultures avoisinantes. Ce produit ne doit donc pas être nébulisé. De plus, il est recommandé de rincer correctement le pulvérisateur avec de l'eau.

Tous les conifères et plus particulièrement les pins et mélèzes sont très sensibles à une dérive de PREVAIL™.

6 - DELAI AVANT RECOLTE

Éviter la présence de bétail pendant l'application. La Fauche, l'ensilage ou le pâturage d'une prairie traitée est possible à partir de 7 jours après l'application.

Des plantes toxiques comme le séneçon jacobée traitées avec PREVAIL™ sont plus attrayantes pour le bétail avec une concentration plus élevée de toxines. Éviter la présence du bétail dans la prairie pendant la phase de nécrose et destruction du séneçon jacobée. Éviter d'avoir des restes de séneçon jacobée détruit dans les foin ou l'ensilage.

7 - NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR

Le pulvérisateur doit être nettoyé **immédiatement et soigneusement** après l'utilisation de PREVAIL™ afin d'éviter tout dommage sur les cultures sensibles traitées par la suite avec le même pulvérisateur.

- Après utilisation, tout l'appareil de pulvérisation, doit être soigneusement nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur, avec un nettoyant de cuve et de l'eau conformément à l'étiquette ou aux instructions du nettoyant utiliser pour nettoyer la cuve. Répartir l'eau de rinçage sur la culture traitée.
- Éviter la contamination de l'eau pendant la procédure de nettoyage.

8 - AUTRES RECOMMANDATIONS

- SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPa1 Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 4.
- SPe1 Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du clopyralid entre la mi-octobre et la mi-mars.
- SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
- SPo Ne pas pénétrer dans les cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

Porter toujours un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

9 - CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

Ce produit contient des phytohormones et est à conserver à part dans un endroit ventilé, car les émanations de ce produit peuvent altérer d'autres matières et provoquer des dégâts aux autres cultures.

10 - CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION:

Rincer la bouche.

Appeler le CENTRE ANTIPPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION:

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

Enlever les vêtements contaminés.

Laver abondamment à l'eau.

En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint.

Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons **070/245.245** (pour la Belgique) ou SGS (Français) : **+32 474 555 786**.

RESPONSABILITÉ

Le vendeur garantit que la composition de ce produit correspond à la description chimique indiquée sur l'étiquette. Aucune autre garantie, légale ou autre, n'est donnée quant à la qualité ou à l'adéquation à un usage quelconque. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas de défaillance de performance, de dommages ou de blessures quelconques résultant du stockage, de la manipulation, de l'application, de l'utilisation de ce produit et des conditions météorologiques, ou de l'incapacité de ce produit à contrôler les résistances, dans la mesure où ces facteurs échappent au contrôle du vendeur.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Das Mittel ist für berufliche Anwendungen bestimmt.

- SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPa1 Um Resistenzaufbau zu vermeiden, wechseln Sie die Verwendung dieses Produkt mit anderen Produkten mit einer anderen Wirkungsweise ab. Der HRAC-Code für den Wirkmechanismus des Wirkstoffs dieses Produkts ist 4.
- SPe1 Um das Grundwasser zu schützen, dürfen Sie dieses Produkt oder andere Clopyralid enthaltende Produkte, nicht zwischen Mitte Oktober und Mitte März anwenden.
- SPe3 Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten (siehe Anwendungseinschränkungen, Pufferzone).
- SPo Nach der Behandlung sind Grundstücke/Oberflächen erst wieder begehbar, wenn die gesprühte Flüssigkeit getrocknet ist.

Tragen Sie bei der Handhabung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln immer grundlegende Schutzkleidung, die Arme und Beine bedeckt (wenn keine spezielle Schutzkleidung erforderlich ist), chemikalienbeständige Handschuhe und flüssigkeitsdichte Schuhe oder Stiefel.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Giftnotrufzentrale **070/245.245** oder SGS (Deutsch):
+49 40 30101 575