



Primstar™

HERBICIDE

GROUP

2

4

HERBICIDE

HERBICIDE TEGEN DICOTYLEN IN GRANEN EN GRASSEN
HERBICIDE ANTIDICOTYLEES EN CEREALES ET GRAMINEES

Bevat : 144,1 g/L fluroxypyr-meptyl (100 g/L fluroxypyr)

+ 2,5 g/L florasulam, SE - suspo-emulsie

Contient : 144,1 g/L fluroxypyr-meptyl (100 g/L fluroxypyr)

+ 2,5 g/L florasulam, SE suspo-émulsion

Erkenningsnummer/Numéro d'agrément : 9327P/B

Numéro d'agrément : L02128-208

Partijnummer: zie op de bus/No de lot : voir sur le flacon

Product bestemd voor beroepsgebruik /

Produit destiné à un usage professionnel

Toelatingshouder/Déteneur d'approbation:

Corteva Agriscience Netherlands B.V.

Zuid-Oostsingel 24D, 4611 BB Bergen Op Zoom, Nederland

Tel: 0031 164 444 000 • Website: www.corteva.be

Verdeler/Distributeur: Corteva Agriscience Belgium B.V.

Rue Montoyer 25, 1000 Brussel, België

ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTIPOISONS : 070/245.245

POUR LE G.-D. DU LUXEMBOURG : (+352) 8002 5500

™ Trademarks of Corteva Agriscience and
its affiliated companies.

5Le

0287431

2410



LEGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden (3 opeenvolgende malen schudden met water). Het bekomen spoelwater ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt. Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.



www.agrirecover.eu

WERKINGSSPECTRUM

Zéér gevoelige dicotylen

Boterbloemen

Herderstasje

Herik

Hondspeterselie

Kamille

Klaproos

Kleefkruid

Klein kruiskruid

Knopherik

Muur

Paardebloem

Perzikkruid
Zuring jong
Zwaluwtong
Zwarte nachtschade

Ongevoelige dicotylen

Ereprijs, akkerviooltje, dovenetel (VVL)

GEBRUIKSAANWIJZING

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.

1 - ERKENDE TEELTEN

- Grasland-weiland, gazons en grasvelden (zonder golfterreinen) en golfterreinen (open lucht)
- Graszaadteelt (open lucht).
- Kerstsparren (open lucht) (niet bestemd voor consumptie).
- Winter- en zomergranen: tarwe, gerst, spelt, rogge, haver en triticale (open lucht) (+ zaadproductie).

2 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING

Toepassingstechniek: bespuiting.

2-1 IN WINTER- EN ZOMERGRANEN (+ zaadproductie) (open lucht)

Maximaal 1 toepassing.

STADIUM

In alle winter- en zomergranen en granen voor zaadproductie: toepassing vanaf begin uitstoeling (eerste spruit zichtbaar) tot het stadium eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak (BBCH 21-31):

DOSIS

Ter bestrijding van vogelmuur (*Stellaria media*) en kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*): 0,5 L/ha.

Ter bestrijding van kleeftkruid (*Galium aparine*) en éénjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*): 1 L/ha.

In menging met een vloeibare stikstofmeststof, een uitvloeier of een ander herbicide worden de vermelde doses gehalveerd.

STADIUM

In wintertarwe, wintergerst en winterspelt en in de zaadproductie van wintertarwe, wintergerst en winterspelt ook toepassing mogelijk vanaf het stadium 2^{de} knoop minstens 2 cm boven de eerste knoop tot het stadium dat het vlagblad volledig is uitgegroeid, ligula zichtbaar (BBCH32-39):

DOSIS

Ter bestrijding van kleeftkruid (*Galium aparine*): 1 L/ha.

In menging met een vloeibare stikstofmeststof, een uitvloeier of een ander herbicide worden de vermelde doses gehalveerd.

2-2 IN GRASLAND-WEILAND, GAZONS en GRASVELDEN (behalve golfterreinen), GOLFTERREINEN en GRASZAADTEELT (open lucht)

Maximaal 1 toepassing/12 maanden.

STADIUM

Vanaf het stadium 3 bladeren ontvouwen ($\geq$ BBCH 13):

DOSIS

Ter bestrijding van vogelmuur (*Stellaria media*) en kamille (echte) (*Matricaria chamomilla*): 0,5 L/ha.

Ter bestrijding van kleeftkruid (*Galium aparine*) en éénjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*): 1 L/ha.

Bij een gevestigd gewas, maart tot oktober:

DOSIS

Ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (annual)*): 1 L/ha.

Ter bestrijding van zuring (*Rumex*) en doorlevende tweezaadlobbige onkruiden (*Dicotyledonae (perennial)*): 2 L/ha.

2-3 IN KERSTSPARREN (open lucht) (niet bestemd voor consumptie)

Maximaal 1 toepassing/12 maanden

STADIUM

In de vegetatieve rustperiode (BBCH 00), in de lente

DOSIS

Ter bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden (éénjarige en doorlevende) (*broadleaved plants*): 1 L/ha

3 - WEERSOMSTANDIGHEDEN



25°C : maximum temperatuur om te spuiten.

5°C : minimum temperatuur om te spuiten.

Temperatuur dient te worden gemeten in de schaduw net vóór de bespuiting.

Niet spuiten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, 's avonds spuiten.



Einde van de behandeling



3 uren



regen

4 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Altijd minimum 75% driftreducerende techniek gebruiken over het volledige veld en een bufferzone van 1 m respecteren tussen het veld en het oppervlaktewater.

Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

5 - WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE VOLGGEWASSEN/ VERVANGGEWASSEN/ STROGEBRUIK EN NABURIGE TEELTEN

Herinzaai 6 weken na de bespuiting mogelijk met: granen (alle), maïs, raaigras. Voor andere gewassen, neem contact op met uw adviseur.

6 - VEILIGHEIDSTERMIJN

In grasland-weiland: 7 dagen wachttijd moet gerespecteerd worden voor het maaien, inkuilen of beweiden

7 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van PRIMSTAR™, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

- Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

8 - OVERIGE AANBEVELINGEN

- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 2 en 4.
- SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen, mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPe3 Om niet doelwitplanten en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen, dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPo Na de behandeling de percelen pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

9 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

10 - EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum **070/245.245** of SGS (Nederlands): **+32 3 575 0330**.

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoper garandeert dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Er wordt geen andere garantie gegeven, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid voor welk doel dan ook. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekkige prestaties, schade of letsel als gevolg van opslag, behandeling, toepassing, gebruik van dit product en weersomstandigheden, of het falen van dit product om resistente populaties onder controle te houden, aangezien dit buiten de controle van de verkoper ligt.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives). Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



www.agrirecover.eu

SPECTRE D'ACTIVITÉ

Dicotylées très sensibles

Aethusa
Capselle
Coquelicot
Gaillet gratteron
Matricaire
Morelle noire
Mouron des oiseaux
Pissenlit
Ravenelle
Renoncule
Renouée faux liseron
Renouée persicaire
Rumex jeune
Sené
Séneçon

Dicotylées non sensibles

Véronique, pensée, lamier (VVL)

MODE D'EMPLOI

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

1 - CULTURES AGRÉÉES

- Céréales d'hiver et de printemps : froment, orge, seigle, avoine, triticale et épeautre (plein air) (+ production de semences).
- Culture de graminées pour la production de semences (plein air).
- Prairies, gazons et pelouses (sauf terrains de golf) et terrains de golf (plein air).
- Sapin de Noël (plein air) (non destinés à la consommation).

2 - DOSES ET STADES D'APPLICATION

Méthode d'application : Pulvérisation.

2-1 EN CÉRÉALES D'HIVER et de PRINTEMPS (plein air) (+ production de semences)

Maximum 1 application/culture.

STADE

Dans toutes les céréales d'hiver et de printemps et en céréales pour la production de semences : application à partir du début tallage (la première talle est visible) jusqu'au stade premier nœud est au plus à 1 cm au-dessus du plateau de tallage (BBCH 21-31) :

DOSE

Contre camomille (*Matricaria chamomilla*) et mouron des oiseaux (*Stellaria media*): 0,5 L/ha.

Contre gaillet gratteron (*Galium aparine*) et dicotylées annuelles (*Dicotyledonae (annual)*): 1 L/ha.

En mélange avec un engrais azote liquide, un mouillant ou un autre herbicide, les doses mentionnées seront diminuées de moitié.

STADE

En froment d'hiver, orge d'hiver et épeautre et en céréales pour production de semences un traitement est aussi possible à partir du

stade deuxième nœud (plus de 2 cm au-dessus du premiers nœud) jusqu'au stade le limbe de la dernière feuille est entièrement étalé, la ligule est visible (BBCH 32-39) :

DOSE

Contre gaillet gratteron (*Galium aparine*) : 1 L/ha.

En mélange avec un engrais azote liquide, un mouillant ou un autre herbicide, les doses mentionnées seront diminuées de moitié.

2-2 EN PRAIRIES, GAZONS et PELOUSES (sauf terrains de golf), TERRAINS DE GOLF et CULTURE DE GRAMINÉES (production de semences) (plein air)

Maximum 1 application/12 mois.

STADE

À partir du stade 3 feuilles étalées ($\geq$ BBCH 13) :

DOSE

Contre camomille (*Matricaria chamomilla*) et mouron des oiseaux (*Stellaria media*) : 0,5 L/ha.

Contre gaillet gratteron (*Galium aparine*) et dicotylées annuelles (*Dicotyledonae (annual)*) : 1 L/ha.

Dans une culture établie, de mars à octobre :

DOSE

Contre dicotylées annuelles (*Dicotyledonae (annual)*) : 1 L/ha.

Contre le rumex oseille (*Rumex*) et dicotylées vivaces (*Dicotyledonae (perennial)*) : 2 L/ha.

2-3 EN SAPINS DE NOËL (plein air) (non destinés à la consommation)

Maximum 1 application/12 mois.

STADE

Pendant la période de dormance hivernale (BBCH 00), au printemps

DOSE

Contre dicotylées (annuelles et vivaces) (*Dicotyledonae (annual & perennial)*) : 1L/ha

3 - CONDITIONS CLIMATIQUES



25°C : température maximale d'utilisation.

5°C : température minimale d'utilisation.

La prise de température se fait à l'ombre juste avant de pulvériser. Par temps chaud, traiter le soir. Ne pas traiter par vent du nord ou d'est.



Fin du traitement



3 heures



pluie

4 - MESURES DE REDUCTION DU RISQUE

Toujours utiliser une technique réduisant la dérive de minimum 75% lors du traitement et respecter une zone tampon de 1 m entre la parcelle traitée et les points d'eau.

En plus des zones tampons mentionnées, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.

5 - AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES CULTURES SUIVANTES/ REMPLAÇANTES/ AVOISINANTES ET L'USAGE DU FOIN

6 semaines après le traitement, il est possible de ressemer : céréales (toutes), maïs, ray gras. Pour les autres, consulter votre conseiller habituel.

6 - DELAI AVANT RECOLTE

Prairies : un délai de 7 jours doit être respecté avant la fauche, l'ensilage ou le pâturage.

7 - NETTOYAGE DU PULVERISATEUR

Le pulvérisateur doit être nettoyé **immédiatement et soigneusement** après l'utilisation de PRIMSTAR™ afin d'éviter tout dommage sur les cultures sensibles traitées par la suite avec le même pulvérisateur.

- Après utilisation, tout l'appareil de pulvérisation, doit être soigneusement nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur, avec un nettoyeur de cuve et de l'eau conformément à l'étiquette ou aux instructions du nettoyeur utiliser pour nettoyer la cuve. Répartir l'eau de rinçage sur la culture traitée.
- Éviter la contamination de l'eau pendant la procédure de nettoyage.

8 - AUTRES RECOMMANDATIONS

- SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
- SPa1 Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 2 et 4.
- SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).
- SPe3 Pour protéger les plantes non ciblées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque).
- SPo Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

Portez toujours des vêtements de protection de base couvrant les bras et les jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application de produits phytopharmaceutiques.

9 - CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

10 - CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation cutanée ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons **070/245.245** (pour la Belgique), **(+352) 8002 5500** (pour le G.-D. du Luxembourg) ou SGS (Français) : **+32 474 555 786**.

RESPONSABILITÉ

Le vendeur garantit que la composition de ce produit correspond à la description chimique indiquée sur l'étiquette. Aucune autre garantie, légale ou autre, n'est donnée quant à la qualité ou à l'adéquation à un usage quelconque. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas de défaillance de performance, de dommages ou de blessures quelconques résultant du stockage, de la manipulation, de l'application, de l'utilisation de ce produit et des conditions météorologiques, ou de l'incapacité de ce produit à contrôler les résistances, dans la mesure où ces facteurs échappent au contrôle du vendeur.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Das Mittel ist für berufliche Anwendungen bestimmt.

- SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPa1 Um Resistenzaufbau zu vermeiden, wechseln Sie die Verwendung dieses Produkt mit anderen Produkten mit einer anderen Wirkungsweise ab. Die HRAC-Codes für die Wirkungsweise des Wirkstoffs dieses Produkts sind 2 und 4.
- SPe3 Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten (siehe Anwendungseinschränkungen, Pufferzone).
- SPe3 Zum Schutz von Nichtzielpflanzen ist zwingend ein Verlustminderndes Gerät mit der prozentual niedrigsten Abdriftminderungsklasse anzuwenden (siehe Anwendungseinschränkungen, Pufferzone).
- SPo Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.

Tragen Sie bei der Handhabung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln immer grundlegende Schutzkleidung, die Arme und Beine bedeckt (wenn keine spezielle Schutzkleidung erforderlich ist), chemikalienbeständige Handschuhe und flüssigkeitsdichte Schuhe oder Stiefel.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Giftnotrufzentrale **070/245.245** oder SGS (Deutsch):
+49 40 30101 575