

Primus™ Perfect

HERBICIDE

GROUP 2 | 4 HERBICIDE

SELECTIEF HERBICIDE TEGEN BREEDBLADIGEN IN GRANEN (INCL. ZAADPRODUCTIE) HERBICIDE SELECTIF ANTIDICOTYLÉES EN CÉRÉALES (INCL. PRODUCTION DE SEMENCES)

Bevat: 25 g/L florasulam + 300 g/L clopyralid, SC – suspensie concentraat
Contient : 25 g/L florasulam + 300 g/L clopyralid, SC – suspension concentrée

Erkenningsnummer/Numéro d'agrégation : 10317P/B
Numéro d'agrégation : L02034-208

Partijnummer: zie op de bus/No de lot : voir sur le flacon

Product bestemd voor beroepsgebruik / Produit destiné à un usage professionnel

Toelatingshouder/Déteneur d'approbation:

Corteva Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24D, 4611 BB Bergen Op Zoom, Nederland
Tel: 0031 164 444 000 • Website: www.corteva.be

Verdeler/Distributeur:

Corteva Agriscience Belgium B.V.
Rue Montoyer 25, 1000 Brussel
België

ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTIPPOISONS : 070/245.245
POUR LE G.-D. DU LUXEMBOURG : (+352) 8002 5500

™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

UFI: PGT6-RQJS-U00R-2WNM



WAARSCHUWING / ATTENTION / WARNUNG

GHS09

Classificatie voor België / Classification pour la Belgique / Klassifizierung für Belgien

GEVARENAANDUIDINGEN	MENTIONS DE DANGER	GEFAHRENHINWEISE
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	CONSEILS DE PRUDENCE	SICHERHEITSHINWEISEN
P280 Beschermende handschoenen dragen.	Porter des gants de protection.	Schutzhandschuhe tragen.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.	Recueillir le produit répandu.	Verschüttete Mengen aufnehmen.
AANVULLENDE INFORMATIE	INFORMATION ADDITIONNELLES	SONSTIGE ANGABEN
EUH208 Bevat 1,2 benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.	Contient 1,2 benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.	Enthält 1,2 Benzisothiazolin-3-one. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.
EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid in het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Classification supplémentaire pour le Luxembourg/ Zusätzliche Klassifizierung für Luxemburg

CONSEILS DE PRUDENCE	SICHERHEITSHINWEISEN
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Tenir hors de portée des enfants.	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur.	Inhalt/Behälter der Entsorgung in Übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmungen zuführen.



0293188

2503



LEGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden (3 opeenvolgende malen schudden met water). Het bekomen spoelwater ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvorschriften. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.



www.agrirecover.eu

WERKINGSSPECTRUM

Gevoelige breedbladigen

Akkerdistel
Akkerhoornbloem
Chicoreiopsag
Guichelheil
Herderstasje
Herik
Kamille (echte)
Klaproos
Kleefkruid
Klein kruiskruid

Knopherik
Koolzaad
Korenbloem
Melkdistel
Muur
Perzikkruid
Vergeet-mij-nietje
Zwaluwtong
Zwarte nachtschade

Ongevoelige breedbladigen

Ereprijs, akkerviooltje, dovenetel (VVL).

PRIMUS™ PERFECT bestrijdt geen grasachtige onkruiden.

GEBRUIKSAANWIJZING

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachttermijn(en) te verkorten.

1 - ERKENDE TEELTEN

Winter- en zomergranen : tarwe, gerst, haver, rogge, triticale en spelt (+ zaadproductie).

2 - DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING

Toepassingstechniek: bespuiting.

2-1 IN GRANEN (+ zaadproductie) (open lucht)

STADIUM

Enkel toepassen na opkomst in het voorjaar vanaf het stadium 4 bladeren ontvouwen tot de eerste knoop minstens 1 cm boven uitstoelingsvlak (BBCH 14 tot 31). Maximaal 1 toepassing/12 maanden.

DOSIS

Tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden : 0,1 tot 0,15 L/ha, 1 toepassing.
120 dagen respecteren tussen behandeling en bewerken, zaaien of planten.

3 - WEERSOMSTANDIGHEDEN



25°C : maximum temperatuur om te spuiten.

0°C : minimum temperatuur om te spuiten.

Temperatuur dient te worden gemeten in de schaduw net vóór de bespuiting.
Niet spuiten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, 's avonds spuiten.



Einde van de behandeling



3 uren



regen

4 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Altijd minimum 90% driftreducerende techniek gebruiken over het volledige veld en een bufferzone van 1 m respecteren tussen het veld en het oppervlaktewater.

Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

5 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van PRIMUS™ PERFECT, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

- Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

6 - OVERIGE AANBEVELINGEN

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

SPa1 Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC codes voor het werkingsmechanisme van de werkzame stoffen van dit product zijn 2 en 4.

SPe1 Om het grondwater te beschermen mag u dit product of andere producten die clopyralid bevatten niet toepassen tussen half oktober en half maart.

SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

SPe3 Om niet doelwitplanten te beschermen dient u een verplicht minimum percentage driftreductie toe te passen (zie risicobeperkende maatregelen).

SPo Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

7 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

8 - EERSTE HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN :

De mond spoelen.

Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING :

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID :

Verontreinigde kleding uittrekken.

Met veel water wassen.

Bij huidirritatie : een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN :

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie : een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum **070/245.245** of SGS (Nederlands): **+32 3 575 0330**.

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoper garandeert dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Er wordt geen andere garantie gegeven, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid voor welk doel dan ook. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekkige prestaties, schade of letsel als gevolg van opslag, behandeling, toepassing, gebruik van dit product en weersomstandigheden, of het falen van dit product om resistente populaties onder controle te houden, aangezien dit buiten de controle van de verkoper ligt.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives). Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



www.agrirecover.eu

SPECTRE D'ACTIVITÉ

Dicotylées sensibles

Bleuet
Capselle
Céraiste
Chardon des champs
Colza
Coquelicot
Gaillet gratteron
Matricaire camomille
Morelle noire
Mouron des oiseaux

Mouron Rouge
Myosotis
Ravenelle
Renouée faux-liseron
Renouée persicaire
Repousses de colza
Repousses de chicorées
Sené
Séneçon vulgaire

Dicotylées non sensibles

Véronique, pensée, lamier (VVL).

PRIMUS™ PERFECT n'est pas efficace contre les graminées.

MODE D'EMPLOI

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

1 - CULTURES AGREES

Belgique : en céréales d'hiver et de printemps : froment, orge, avoine (à l'exception de l'avoine d'hiver), seigle, triticale et épeautre (+ production de semences).

Luxembourg : en céréales d'hiver et de printemps : orge, avoine, blé, seigle d'hiver, triticale d'hiver, blé dur, épeautre. En graminées fourragères (production de semences).

2 - DOSES ET STADES D'APPLICATION

Méthode d'application : Pulvérisation.

2-1 EN CÉRÉALES (plein air) (PRODUCTION DE SEMENCES SEULEMENT EN BELGIQUE)

Belgique

STADE

Uniquement en post-émergence au printemps à partir du stade 4 feuilles étalées jusqu'au stade premier nœud est au moins à 1 cm au-dessus du plateau (BBCH 14 à 31).

Maximum une application/culture.

DOSE

Contre dicotylées annuelles : 0,1 à 0,15 L/ha, 1 application.

120 jours entre l'application et labourer le sol, semer ou planter.

Luxembourg

STADE

- **Pour les céréales de printemps et blé dur** : Uniquement en post-émergence au printemps à partir de trois feuilles étalées jusqu'au début de la montaison : pseudo-tiges et talles dressées, début d'élongation du premier entre-nœud, inflorescence au plus à 1 cm au-dessus du plateau de tallage (BBCH 13 à BBCH 30).

- **Pour les céréales d'hiver et épeautre** : Uniquement en post-émergence au printemps à partir de trois feuilles étalées jusqu'au stade où le deuxième nœud est au plus à 2 cm au-dessus du premier nœud (BBCH 13 à BBCH 32).

Max. une application/culture. Max. une application/12 mois.

DOSE

Contre les dicotylées annuelles : 0,2 L/ha, dosage dans 200 à 400 L d'eau/ha.

2-2 EN GRAMINEES FOURRAGERES (PRODUCTION DE SEMENCES)

Luxembourg

STADE

Uniquement en post-émergence à partir du stade 3^e feuille jusqu'à formation de la rosette.

Max. une application/culture. Max. une application/12 mois.

DOSE

Contre les dicotylées annuelles : 0,2 L/ha, dosage dans 200 à 400 L d'eau/ha.

3 - CONDITIONS CLIMATIQUES



25°C : température maximale d'utilisation.

0°C : température minimale d'utilisation.

La prise de température se fait à l'ombre juste avant de pulvériser.
Par temps chaud, traiter le soir. Ne pas traiter par vent du nord ou d'est.



Fin du traitement



3 heures



pluie

4 - MESURES DE REDUCTION DU RISQUE

Belgique : Toujours utiliser une technique réduisant la dérive de minimum 90 % lors du traitement et respecter une zone tampon de 1 m entre la parcelle traitée et les points d'eau.

Luxembourg : zone tampon de 5 m avec technique classique.

En plus des zones tampons mentionnées, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.

5 - NETTOYAGE DU PULVERISATEUR

Le pulvérisateur doit être nettoyé **immédiatement et soigneusement** après l'utilisation de PRIMUS™ PERFECT afin d'éviter tout dommage sur les cultures sensibles traitées par la suite avec le même pulvérisateur.

- Après utilisation, tout l'appareil de pulvérisation, doit être soigneusement nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur, avec un nettoyant de cuve et de l'eau conformément à l'étiquette ou aux instructions du nettoyant utiliser pour nettoyer la cuve. Répartir l'eau de rinçage sur la culture traitée.
- Éviter la contamination de l'eau pendant la procédure de nettoyage.

6 - AUTRES RECOMMANDATIONS

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPa1 Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Les codes HRAC pour le mode d'action des substances actives de ce produit sont 2 et 4.

SPe1 Pour protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant clopyralid entre mi-octobre et mi-mars.

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

SPe3 Pour protéger les plantes non ciblées appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive (voir mesures de réduction du risque).

SPo Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

Portez toujours des vêtements de protection de base couvrant les bras et les jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application de produits phytopharmaceutiques.

7 - CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

8 - CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés.

Laver abondamment à l'eau.

En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons **070/245.245** (pour la Belgique),
(+352) 8002 5500 (pour le G.-D. du Luxembourg) ou SGS (Français) : **+32 474 555 786**.

RESPONSABILITÉ

Le vendeur garantit que la composition de ce produit correspond à la description chimique indiquée sur l'étiquette. Aucune autre garantie, légale ou autre, n'est donnée quant à la qualité ou à l'adéquation à un usage quelconque. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas de défaillance de performance, de dommages ou de blessures quelconques résultant du stockage, de la manipulation, de l'application, de l'utilisation de ce produit et des conditions météorologiques, ou de l'incapacité de ce produit à contrôler les résistances, dans la mesure où ces facteurs échappent au contrôle du vendeur.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

- SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPa1 Um eine Resistenzbildung zu vermeiden, sollten Sie dieses Produkt abwechselnd mit Produkten einsetzen, die eine andere Wirkungsweise haben. Die HRAC-Codes für den Wirkmechanismus der Wirkstoffe dieses Produkts sind 2 und 4.
- SPe1 Zum Schutz des Grundwassers darf dieses oder ein anderes clopyralidhaltiges Produkt nicht zwischen Mitte Oktober und Mitte März ausgebracht werden.
- SPe3 Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten (siehe Maßnahmen zur Risikominderung).
- SPe3 Zum Schutz von Nichtzielpflanzen ist zwingend ein Verlustminderndes Gerät mit der prozentual niedrigsten Abdriftminderungsklasse anzuwenden (siehe Maßnahmen zur Risikominderung).
- SPo Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.

Tragen Sie bei der Handhabung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln immer grundlegende Schutzkleidung, die Arme und Beine bedeckt (wenn keine spezielle Schutzkleidung erforderlich ist), chemikalienbeständige Handschuhe und flüssigkeitsdichte Schuhe oder Stiefel.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Giftnotrufzentrale **070/245.245** oder SGS (Deutsch): **+49 40 30101 575**

Primus™ Perfect

HERBICIDE

GROUP 2 | 4 HERBICIDE

SELECTIEF HERBICIDE TEGEN BREEDBLADIGEN IN GRANEN (INCL. ZAADPRODUCTIE) HERBICIDE SELECTIF ANTIDICOTYLÉES EN CÉRÉALES (INCL. PRODUCTION DE SEMENCES)

Bevat: 25 g/L florasulam + 300 g/L clopyralid, SC – suspensie concentraat
Contient : 25 g/L florasulam + 300 g/L clopyralid, SC – suspension concentrée

Erkenningsnummer/Numéro d'agrèation : 10317P/B
Numéro d'agrèation : L02034-208

Partijnummer: zie op de bus/No de lot : voir sur le flacon

Product bestemd voor beroepsgebruik / Produit destiné à un usage professionnel

Toelatingshouder/Déteneur d'approbation:

Corteva Agriscience Netherlands B.V.
Zuid-Oostsingel 24D, 4611 BB Bergen Op Zoom, Nederland
Tel: 0031 164 444 000 • Website: www.corteva.be

Verdeler/Distributeur:

Corteva Agriscience Belgium B.V.
Rue Montoyer 25, 1000 Brussel
België

ANTIGIFCENTRUM/CENTRE ANTIPOISONS : 070/245.245

POUR LE G.-D. DU LUXEMBOURG : (+352) 8002 5500

™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

UFI: PGT6-R0JS-U00R-2WNM



WAARSCHUWING / ATTENTION / WARNUNG

GHS09

Classificatie voor België / Classification pour la Belgique / Klassifizierung für Belgien

	GEVARENAANDUIDINGEN	MENTIONS DE DANGER	GEFAHRENHINWEISE
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
	VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	CONSEILS DE PRUDENCE	SICHERHEITSHINWEISEN
P280	Beschermende handschoenen dragen.	Porter des gants de protection.	Schutzhandschuhe tragen.
P391	Gelekte/gemorste stof opruimen.	Recueillir le produit répandu.	Verschüttete Mengen aufnehmen.
	AANVULLENDE INFORMATIE	INFORMATION ADDITIONNELLES	SONSTIGE ANGABEN
EUH208	Bevat 1,2 benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.	Contient 1,2 benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique.	Enthält 1,2 Benzisothiazolin-3-one. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.
EUH401	Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Classification supplémentaire pour le Luxembourg/ Zusätzliche Klassifizierung für Luxemburg

	CONSEILS DE PRUDENCE	SICHERHEITSHINWEISEN
P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102	Tenir hors de portée des enfants.	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P501	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur.	Inhalt/Behälter der Entsorgung in Übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmungen zuführen.

0293188

2503