



Victus™ OD

HERBICIDE

HERBICIDE VOOR DE NA-OPKOMSTBESTRIJDING VAN GRASSEN EN BREEDBLADIGE ONKRUIDEN IN MAÏS

HERBICIDE ANTIGRAMINÉES ET ANTICOTYLÉES DE POST-ÉMERGENCE EN MAÏS

UFI: 99NC-Y00H-A00A-CMH6



WAARSCHUWING / ATTENTION / ACHTUNG

GHS09

H410 **GEVARENAANDUIDINGEN**
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P280 **VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN**
Draag beschermende handschoenen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

EUH401 **AANVULLENDE INFORMATIE**
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

MENTIONS DE DANGER
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

CONSEILS DE PRUDENCE
Porter des gants de protection.

Recueillir le produit répandu.

INFORMATION ADDITIONNELLES
Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

GEFAHRENHINWEISE
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

SICHERHEITSHINWEISEN
Schutzhandschuhe tragen.

Verschüttete Mengen aufnehmen.

SONSTIGE ANGABEN
Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Lot N°:

Artwork Free area for
in-house print of
2D data matrix code

LEGE VERPAKKING EN SPUITOVERSCHOTTEN

De zorgvuldig geledigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden (3 opeenvolgende malen schudden met water). Het bekomen spoelwater ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandeld perceel volgens de gebruiksvoorschriften. De aldus gespoelde verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelpunt.

Vijvers, waterlopen of grachten niet vervuilen met het product of de lege verpakking. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare.



WERKINGSSPECTRUM

VICTUS™ OD bestrijdt een groot aantal grassen en tweezaadlobbige onkruiden. De beste en de breedste werking wordt bekomen indien VICTUS™ OD wordt toegepast op jonge en actief groeiende onkruiden. In het algemeen geldt als optimale stadium: kiemblad tot en met 4-blad stadium. Het is belangrijk de onkruiden goed te raken. Bij hergroei en/of nieuwe opkomst kan een herbehandeling noodzakelijk zijn.

In de volgende tabel staan een aantal onkruiden en hun gevoeligheid. Voor overige onkruiden raadpleeg uw leverancier.

(Zeer) gevoelige grassen (G)	Matig gevoelige grassen (MG)	Ongevoelige grassen (OG)
kweek duist haver opslag graan hanepoot raaigrassen naalbaar sorghum straatgras	Vingergras Gierst	
(Zeer) gevoelige breedbladige onkruiden (G)	Matig gevoelige breedbladige onkruiden (MG)	Ongevoelige breedbladige onkruiden (OG)
papegaaiekruid alsem ambrosia akkerscherm driedelig tandzaad koolzaad herderstasje zandkool duivekervel hennepnetel kleefkruid dovenetel bingelkruid duizendknoop perzikkruid knopherik rapistrum kruiskruid herik melkdistel muur witte krodde akkerviool	distel soorten winde soorten Doornappel Zonnebloemen munt soorten Zwaluwtong Akkerandoorn Stekelnoot	melde soorten heermoes varkensgras zwarte nachtschade klimpereprijs

Bij aanwezigheid van onkruiden die ongevoelig (OG) of matig gevoelig (MG) zijn, verdient het aanbeveling om een daartoe geschikt herbicide toe te voegen.

GEBRUIKSAANWIJZING

De toegelaten dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. De dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn(en) te verkorten.

Algemeen

VICTUS[®] OD moet homogeen worden verdeeld. Het vereist een goed afgestelde spuitmachine om niet behandelde gedeelten en overdosering te vermijden.

VICTUS™ OD kan dienen als basis van de na-opkomst bestrijding van een aantal moeilijk te bestrijden grassen of onkruiden, zoals kweek, hanepoot, etc. Om een zo breed mogelijk werkingspectrum te bekomen, kan VICTUS™ OD ingezet worden in combinatie met andere herbiciden (zie ook 'mengingen').

Werking

VICTUS™ OD is een systemisch herbicide en wordt snel, voornamelijk via het blad van de onkruiden, opgenomen. De groei van de gevoelige onkruiden wordt al na enkele uren volledig stop gezet, waardoor er geen concurrentie meer is met het gewas.

Verkleurings- en necrosesymptomen verschijnen en geven enkele weken later aanleiding tot het afsterven van de onkruiden. De snelheid van afsterven is afhankelijk van de soort, leeftijd en groeiomstandigheden van de onkruiden.

VICTUS™ OD wordt snel in de bodem afgebroken en heeft daarom geen nawerking.

Waterhoeveelheid

VICTUS™ OD kan gebruikt worden in een volume van 150-400 l water per ha. Bij een zeer dicht gewas is het aan te bevelen het hoogste watervolume te gebruiken om de onkruiden voldoende te raken.

Vorbereiding van de spuitvloeistof

- Begin met een schone spuitmachine;
- Vul de tank voor de helft met water. Voeg de benodigde hoeveelheid middel toe en stel het roersysteem in werking;
- Vul de tank verder met water;
- Houd tijdens het spuiten het roersysteem in werking.

Mengingen

Bij het maken van mengingen eerst vaste formuleringen, daarna vloeibare formuleringen en tenslotte eventuele uitvloeiers toevoegen aan de tank.

VICTUS™ OD kan niet gemengd worden met:

- Minerale olie;
- Organische fosforverbindingen.

Tussen een toepassing van VICTUS™ OD en de genoemde producten moet minimaal een periode van 7 dagen aanwezig zijn.

1 – ERKENDE TEELTEN

Maïs (behalve suikermais) (open lucht).

2 – DOSERING EN TIJDSTIP VAN TOEPASSING

Het is toegestaan in totaal maximaal 1 toepassing per teelt uit te voeren in de lente.

VICTUS™ OD dient te worden toegepast op een droog en gezond gewas. Indien het middel wordt toegepast op gewassen welke in een slechte conditie verkeren kan vergeling en/of groeireductie optreden.

Toepassingstechniek: bespuiting.

2-1 IN SNIJ- EN KORRELMAÏS (open lucht)

NIET toepassen in SUIKERMAIS, teelt onder plastic en bij de teelt voor zaadproductie en inteeltlijnen. VICTUS™ OD kan veilig worden toegepast in alle maïsrassen. Sommige maïsrassen zijn echter gevoeliger voor dit product dan andere.

STADIUM

VICTUS™ OD kan toegepast worden vanaf het 2-blad stadium -- het 8-blad stadium van het gewas (BBCH 12 - 18).

DOSIS

1L/ha

3 – WEERSOMSTANDIGHEDEN



25°C : maximum temperatuur om te spuiten.

5°C : minimum temperatuur om te spuiten.

De werking van VICTUS™ OD is redelijk afhankelijk van de weersomstandigheden:

- Na een koude periode (minder dan 10 °C) met voortdurende neerslag dient te worden gewacht met de toepassing tot de maisplanten zijn hersteld en een waslaag hebben gevormd. Het is van belang een periode van gematigde temperaturen de dagen na de toepassing te hebben (lager dan 25°C). Wanneer enkele dagen met hoge temperaturen worden verwacht is het aan te raden de behandeling uit te stellen.
- Niet toepassen wanneer nachtvorst wordt verwacht, of bij grote schommelingen tussen dag- en nachttemperatuur.
- Als binnen 24 uur na de geplande toepassing zware neerslag wordt verwacht, moet de toepassing worden uitgesteld.



Einde behandeling

<=

3 uur

=>

regen



LET OP:

Het wordt aanbevolen om VICTUS™ OD niet toe te passen op een gewas dat in een slechte conditie verkeert.

4 – RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Respecteer een bufferzone van 20 m ten opzichte van oppervlaktewater met klassieke techniek. Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten. Het overwaaien van spuitnevel (drift) naar oppervlaktewater (meren en sloten), naburige en/of nog te zaaien of planten gewassen moet worden voorkomen. Spuit daarom bij rustig weer met weinig wind.

5- WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE VOLGGEWASSEN EN VERVANGGEWASSEN

Volggewassen

Na de toepassing van VICTUS™ OD kunnen na ploegen de volgende gewassen geteeld worden:

- na 4 maanden: wintergranen
- na 8 maanden: zomergranen
- na 10 maanden: alle andere gewassen

Vervanggewassen

In geval van mislukking van het gewas kan alleen snij- of korrelmais worden geteeld.

LET OP:

Bij gebrek aan voldoende informatie wordt afgeraden groente-gewassen, bloemen, sierplanten, bloembollen, heesters of bomen te telen binnen 16 maanden na de toepassing van VICTUS™ OD. Deze aanbevelingen houden geen rekening met eventueel andere herbiciden die in hetzelfde jaar op hetzelfde perceel werden toegepast (betrokken firma raadplegen).

6 – RESISTENTIEMANAGEMENT

VICTUS™ OD bevat één actieve stof: nicosulfuron. Dit molecuul behoort tot de chemische familie van de sulfonylurea (HRAC 2). De werking van nicosulfuron berust op de blokkering van het enzym ALS (aceto lactate synthase). Wanneer herbiciden met dezelfde werkingswijze herhaaldelijk toegepast worden, gedurende verschillende jaren, om dezelfde soorten onkruiden te bestrijden, in hetzelfde veld, kunnen bepaalde resistente biotypes, die van nature aanwezig zijn in een populatie, overleven en dominant worden in deze percelen.

Om te vermijden dat bovengenoemd fenomeen (versneld) optreedt, is het belangrijk dat de teler:

- In hetzelfde gewas, in hetzelfde teeltjaar de toepassing van VICTUS™ OD afwisselt of mengt met producten (of mengingen van producten) met een verschillende werkingswijze. Het wordt ten eerste aanbevolen om maximaal op 2 spuitmomenten per seizoen producten toe te passen met dezelfde werkingswijze als VICTUS™ OD.
- In de rotatie: gebruik op eenzelfde perceel en in de loop van de teeltrotatie, herbiciden met verschillende werkingswijze.
- De gebruiksaanwijzing, zoals deze op het etiket staat vermeld, met betrekking tot de dosering, het spuitinterval en het optimale toepassingsmoment opvolgt.

De mogelijke aanwezigheid van resistentie kan niet worden voorspeld. Raadpleeg uw adviseur voor aanbevelingen op het gebied van resistentiemanagement.

7 – REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van VICTUS™ OD, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld. De meeste cultuur gewassen zijn zeer gevoelig!!!

- Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een hiervoor geschikt tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Herhaal deze procedure nog eenmaal.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

8 – OVERIGE AANBEVELINGEN

- SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De HRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 2.
- SPe1 Om het grondwater te beschermen mag de totale hoeveelheid nicosulfuron/ha aangebracht door dit product of andere producten die nicosulfuron bevatten niet hoger zijn dan 45 g/ha/12 maanden.
- SPe2 Om in het water levende organismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als “sterk erosiegevoelig”. Voor het Waals Gewest komt

dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.

SPe3 Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).

SPo Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Draag steeds basisbeschermingskledij die armen en benen bedekt (indien geen specifieke beschermkledij vereist is), chemisch bestendige handschoenen en vloeistofdichte schoenen of laarzen bij het hanteren en toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

9 – OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

10 – EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten.

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum **070/245.245** of SGS (Nederlands):

+32 3 575 0330.

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoper garandeert, dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Verkoper kan alleen garanderen, dat het product redelijk geschikt is voor de doeleinden op het etiket vermeld, waar het onder normale omstandigheden wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. De garantie vervalt bij gebruik van dit product in afwijking van de aanwijzingen, bij gebruik onder abnormale omstandigheden of bij gebruik onder omstandigheden, die redelijkerwijze niet door verkoper konden worden voorzien; in zulke gevallen draagt de koper het volledig risico. Enige andere garantie of aansprakelijkheid wordt door verkoper niet verstrekt noch aanvaard en mag ook niet uit het bovenstaande worden afgeleid.

EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

L'emballage de ce produit soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système manuel (3 agitations successives). Diluer les eaux de ce nettoyage environ 10 fois et pulvériser celles-ci sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. L'emballage ainsi rincé devra être ramené par l'utilisateur aux points de ramassage prévus à cet effet.

Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer, ou la quantité à appliquer, en fonction de la superficie à traiter et du débit par hectare.



SPECTRE D'ACTIVITE

VICTUS™ OD détruit un grand nombre de mauvaises herbes dicotylédones et graminées. La meilleure efficacité sera obtenue si l'on traite des adventices jeunes en pleine croissance. En général, le stade optimal est : cotylédons jusque y compris 4 feuilles. Il est important de bien toucher les mauvaises herbes. Lors de repousses ou de nouvelles levées un second traitement peut être nécessaire.

Le tableau suivant, reprend la sensibilité d'une série d'adventices. Pour les autres adventices, consultez votre revendeur.

Graminées (très) sensibles (S)	Graminées moyennement sensibles (MS)	Graminées non-sensibles (NS)
Chiendent Vulpin Avoine Repousses de céréales Panic Ray-grass Sétaire Sorgho Paturin	Digitaire glabre Digitaire sanguine	
Dicotylédones (très) sensibles (S)	Dicotylédones moyennement sensibles (MS)	Dicotylédones non-sensibles (NS)
Amarante Armoise Ammi Bidet tripartite Colza Capselle Diploaxis Fumeterre Ortie royale Gaillet Lamier Mercuriale Renouée feuilles patience Renouée persicaire Ravenelle Rapistre Seneçon Moutarde des champs Laiteron Mouron Tabouret Pensée	Chardons Liserons Datura stramoine Tournesol Mente Renouée liseron Epière des champs Lampourde	Chénopode Prêle Renouée des oiseaux Morelle noire Véronique fe de lierre

Lors de la présence de mauvaises herbes qui sont peu sensibles ou moyennement sensibles, il est préférable de rajouter un herbicide approprié.

MODE D'EMPLOI

La dose autorisée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du (des) délai(s) d'attente.

En général

VICTUS™ OD doit être appliqué de façon homogène. Il est nécessaire d'avoir un pulvérisateur en bon état de marche afin d'éviter que certaines parties ne soient pas traitées ou qu'il y ait des surdosages. VICTUS™ OD peut servir de base pour le désherbage de post émergence du maïs pour détruire des mauvaises herbes telles que les graminées et les dicotylées comme par exemple chiendent, mouron,

etc. Afin d'obtenir un spectre aussi large que possible, VICTUS™ OD s'utilisera en général en mélange avec d'autres herbicides (voir aussi "mélanges").

Mode d'action

VICTUS™ OD est un herbicide systémique qui est très rapidement absorbé, principalement par le feuillage des adventices. La croissance des mauvaises herbes est déjà stoppée quelques heures après la pulvérisation.

Par la suite, des symptômes de décoloration et de nécroses apparaissent et se traduisent par la disparition des adventices. La vitesse de destruction des adventices est dépendante de l'espèce et du développement de celles-ci.

VICTUS™ OD est très rapidement dégradé dans le sol et n'a de ce fait aucune rémanence.

Volume d'eau

VICTUS™ OD s'applique avec un volume d'eau de 150-400 litres à l'hectare. Lorsque le peuplement est très dense, il est conseillé d'utiliser le volume d'eau le plus important pour que le traitement pénètre bien jusqu'aux adventices.

Préparation de la bouillie de pulvérisation

- Commencer avec un pulvérisateur propre;
- Remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Ajouter la quantité nécessaire de produit et mettre le système d'agitation en marche;
- Terminer le remplissage de la cuve avec de l'eau;
- Pendant la pulvérisation, laisser le système d'agitation en marche.

Mélanges

Lors de la fabrication des mélanges, d'abord des formulations solides, puis des formulations liquides et enfin ajouter des agents mouillants dans la cuve.

Le VICTUS™ OD ne peut pas être mélangé avec:

- Huile minérale;
- Organo-phosphorés.

Entre une application de VICTUS™ OD et celle des produits précités, il est nécessaire de garder un intervalle de 7 jours.

1 – CULTURES AGREES

Mais (sauf maïs doux) (plein air)

2 – DOSES ET STADES D'APPLICATION

Il est permis de faire au maximum 1 application par culture au printemps.

VICTUS™ OD doit être appliqué sur une végétation sèche et saine. Si le produit est appliqué sur une culture n'étant pas saine, il peut apparaître des symptômes de jaunissement et/ou des freinages de croissance.

Méthode d'application : Pulvérisation.

2-1 – EN MAIS ENSILAGE ET MAIS GRAIN (plein air)

NE PAS utiliser en maïs doux, maïs sous plastic ou dans la production de semences ou de lignées variétales.

VICTUS™ OD peut être utilisé sur toutes les variétés de maïs. Certaines variétés sont sensibles.

STADE:

VICTUS™ OD peut être utilisé du stade deux vraies feuilles jusqu'au stade 8 feuilles de la culture (BBCH 12-18).

DOSE
1 L/ha

3 – CONDITIONS CLIMATIQUES



25°C : température maximum d'utilisation.

5°C : température minimum d'utilisation.

L'effet de VICTUS™ OD est raisonnable dépendante des conditions atmosphériques:

- Après une période de temps froid (moins de 10°C) avec de la pluie, il est nécessaire d'attendre que le maïs ait récupéré et que la cuticule soit reformée. Quand on s'attend à une période de températures élevées il est conseillé d'ajourner le traitement, afin d'assurer une période de températures modérées (inférieures à 25°C) quelques jours après l'application.
- Ne s'applique pas si le gel est attendu, ou en cas de grandes fluctuations de températures entre le jour et la nuit.
- Si dans les 24 heures après l'application prévue de fortes précipitations est attendue, l'application soit différée.



Fin du traitement

<=

3 heures

=>

pluie



ATTENTION:

Il est recommandé que VICTUS™ OD ne s'applique pas à une culture en mauvais état.

4 – MESURES DE REDUCTION DU RISQUE

Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.

En plus des zones tampons mentionnées, des zones tampons régionales sont également d'application. Respectez toujours la zone tampon la plus large.

Etant donné la grande sensibilité de certaines cultures à ce produit, il est nécessaire de veiller tout particulièrement à éviter tout dégât aux cultures avoisinantes. Toute dérive de bouillie de pulvérisation, vers des eaux de surface (mares ou étangs) ou une culture voisine présente ou à planter, doit être évitée. Veuillez de ce fait pulvériser par temps calme avec peu de vent.

5 – AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES CULTURES SUIVANTES ET LES CULTURES DE REMPLACEMENT

Cultures suivantes

Après traitement avec VICTUS™ OD, après labour les cultures suivantes peuvent être implantées :

- Après 4 mois: céréales d'hiver
- Après 8 mois: céréales d'froment
- Après 10 mois: toutes les cultures annuelles

Cultures de remplacement

En cas d'échec culture, seule maïs peut être implantée.

ATTENTION:

En raison d'un manque d'information suffisante, il est déconseillé de planter des cultures maraîchères, des cultures ornementales ou florales, des bulbes, des arbres ou des arbrisseaux dans les 16 mois suivant le traitement avec VICTUS™ OD.

Ces recommandations ne tiennent pas compte des autres herbicides que la parcelle aurait reçu durant la même année (consulter les firmes en question).

6 – PREVENTION DE LA RESISTANCE

VICTUS™ OD contient une seule matière active: nicosulfuron. Cette molécule appartient à la famille des sulfonylurées (HRAC 2). Elles agissent par inhibition de l'enzyme ALS (acétolactate-synthase).

Lorsque des herbicides ayant le même mode d'action sont utilisés consécutivement pendant plusieurs années pour lutter contre les mêmes espèces d'adventices sur la même parcelle, des biotypes résistants, naturellement présents dans la population, peuvent survivre et devenir résistants dans cette parcelle.

Pour éviter que le phénomène ci-dessus se produise très rapidement, il est important que l'utilisateur :

- dans la culture de l'année: mélange ou alterne VICTUS™ OD avec des produits ou des mélanges de produits à modes d'action différent. Il est fortement conseillé de ne pas effectuer plus de 2 traitements avec des produits ayant le même mode d'action que le VICTUS™ OD.
- dans la rotation: utilise sur une même parcelle et au fil des cultures mises en place dans la rotation des herbicides à modes d'action différents.
- suivre le mode d'emploi tel que décrit sur l'étiquette, en tenant compte de la dose, de l'intervalle de pulvérisation et de la période optimale de traitement.

L'apparition de résistances n'est pas prévisible. Consultez votre conseiller pour en savoir plus au sujet de la gestion de la résistance.

7 – NETTOYAGE DU PULVÉRISATEUR

Le pulvérisateur doit être nettoyé **immédiatement et soigneusement** après l'utilisation de VICTUS™ OD, afin d'éviter tout dommage sur les cultures sensibles traitées par la suite avec le même pulvérisateur. La plupart des cultures sont très sensibles!!!

- Après utilisation, tout l'appareil de pulvérisation, doit être soigneusement nettoyé à l'intérieur et à l'extérieur, **avec un nettoyant de cuve adapté** et de l'eau conformément à l'étiquette ou aux instructions du nettoyant utiliser pour nettoyer la cuve. Répartir l'eau de rinçage sur la culture traitée.
- Répéter la procédure encore 1 fois.
- Éviter la contamination de l'eau pendant la procédure de nettoyage.

8 – AUTRES RECOMMANDATIONS

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

SPA1 Pour éviter le développement de résistance, alterner l'emploi de ce produit avec d'autres ayant un mode d'action différent. Le code HRAC pour le mode d'action de la substance active de ce produit est 2.

SPe1 Pour protéger les eaux souterraines, la quantité totale de nicosulfuron/ha apportée par ce produit ou tout autre produit contenant du nicosulfuron ne peut pas dépasser 45 g/ha /12 mois.

SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Pour la Région Flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, cela vaut

pour les parcelles classées comme « sterk erosiegevoelig ». Pour la Région Wallonne, cela correspond aux parcelles identifiées avec le code R. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles à condition que des mesures de lutte contre l'érosion des sols telles que fixées dans les législations régionales soient en œuvre.

SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir mesures de réduction du risque).

SPo Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

Porter toujours un vêtement de protection de base couvrant bras et jambes (si aucun vêtement de protection spécifique n'est requis), des gants résistant aux produits chimiques et des chaussures ou des bottes imperméables lors de la manipulation et de l'application des produits phytopharmaceutiques.

9 – CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

10 – CONSEILS DE PREMIERS SECOURS

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

EN CAS D'INGESTION :

Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

EN CAS D'INHALATION :

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.

En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons **070/245.245** (pour la Belgique), **(+352) 8002 5500** (pour le G.-D. du Luxembourg) où SGS (Français) : **+32 474 555 786**.

RESPONSABILITÉ

Le vendeur garantit que ce produit est conforme à la description chimique indiquée sur cette étiquette et qu'il est destiné aux applications reprises sur l'étiquette et seulement lorsqu'il est utilisé en accord avec les recommandations d'emploi dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie ne s'étend pas à l'usage de ce produit pour des applications non recommandées ou contraires aux indications d'emploi, ou dans des conditions anormales d'utilisation ou sous des conditions qui ne peuvent pas raisonnablement être prévues par le vendeur ; l'acheteur assume tous les risques de tels usages. Le vendeur ne fournit aucune autre garantie, ni expresse, ni impliquée.

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Das Mittel ist für berufliche Anwendungen bestimmt.

- SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen.
- SPa1 Um Resistenzaufbau zu vermeiden, wechseln Sie die Verwendung dieses Produkt mit anderen Produkten mit einer anderen Wirkungsweise ab. Der HRAC-Code für die Wirkungsweise der Wirkstoff dieses Produkt ist 2.
- SPe1 Zum Schutz des Grundwassers darf die Gesamtmenge an Nicosulfuron/ha aus diesem Produkt und jedem anderen Produkt, das den Wirkstoff Nicosulfuron enthält, 45 g/ha alle 12 Monate nicht überschreiten.
- SPe2 Zum Schutz von Wasserorganismen darf dieses Produkt nicht auf erosionsanfälligen Schlägen angewendet werden. In den Regionen Flandern und Brüssel-Hauptstadt gilt dies für die als „sterk erosiegevoelig“ (Sehr erosionsanfällig) eingestuft Schläge. Für die Wallonische Region entspricht dies den mit dem Code R gekennzeichneten Schlägen. Wenn die von der regionalen Gesetzgebung vorgeschriebenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Bodenerosion eingehalten werden, darf das Produkt dennoch angewendet werden.
- SPe3 Zum Schutz von Gewässerorganismen eine unbehandelte Pufferzone zu Oberflächengewässer einhalten (siehe Risikominderungsmaßnahmen).
- SPo Behandelte Grundstücke/Flächen nicht wieder betreten, bevor die Spritzlösung getrocknet ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an der Giftnotrufzentrale **070 / 245.245** (für Belgien), **(+352) 8002 5500** (für den Großherzogtum Luxemburg), oder SGS (Deutsch): **+49 40 30101 575**.