



Bestrijding van zomeronkruiden in grasland



CORTEVA[™]
agriscience

Meerjarige onkruiden, veelal lastig te bestrijden

Zuring en distels zijn zeker de twee meest voorkomende meerjarigen in grasland en zijn eveneens het moeilijkst te bestrijden op lange termijn. Maar ook verschillende schermbloemigen zoals bereklauw, zevenblad, fluitekruid, ... verschijnen volop in deze periode. Anderzijds kunnen meerjarige onkruiden in deze periode ook ideaal worden bestreden, de temperaturen zijn dan voldoende hoog om een goede werking te hebben van de meeste groeistoffen en de planten zijn volop actief (wat een betere bestrijding geeft). Het resultaat van de behandeling hangt natuurlijk af van de productkeuze maar grotendeels ook van het stadium van de onkruiden. Algemeen zijn onkruiden in volle bloei of uitgebloeide onkruiden moeilijk te bestrijden. Een zwakkere sapstroom zorgt ervoor dat de systemische middelen niet meer volledig tot in het wortelstelsel worden getransporteerd.

Het CORTEVA-gamma biedt een complete oplossing voor de bestrijding van meerjarige onkruiden.

Zuring

BOFORT 2 L/ha of DOXSTAR PASTOR 2 L/ha

- **DOXSTAR PASTOR** en **BOFORT** voor een langdurige bestrijding van (overjarige) zuring.
- **DOXSTAR PASTOR** combineert de efficiëntie van **fluroxypyr** met de duurwerking van **triclopyr** op grote zuringplanten.
- Net zoals **BOFORT**, geeft **DOXSTAR PASTOR** een grondige afdoding van het wortelstelsel. **DOXSTAR PASTOR** kunnen perfect worden gemengd met de andere graslandherbiciden van Corteva om het spectrum uit te breiden.

Tabel stadium ZURING

| Te vroeg | Optimaal stadium | Te laat |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Te weinig blad | Stadium rozet | Stadium bloei |

Let wel, BOFORT kan enkel worden toegepast in permanente grasweiden zonder aansluitende stal.

Distels

BOFORT 2 L/ha of **PREVAIL THISTLEX** 1 L/ha of **TREVISTAR** 1.5 L/ha

- **PREVAIL THISTLEX** en **BOFORT** pakken alle distels aan. **PREVAIL THISTLEX** combineren een hoge dosis **MATRIGON** met **triclopyr** om ook bij distels de duurwerking te versterken en geven zodoende eenzelfde grondig resultaat als **BOFORT**. Deze combinatie geeft op alle distels en composieten een zeer goed resultaat.
- Aangevuld met **florasulam** bevattende middelen geven deze producten ook een uitstekende bestrijding van schermbloemigen.
- Voor de bestrijding van zuring moet **fluroxypyr** worden toegevoegd.

Tabel stadium DISTELS

| Te vroeg | Optimaal stadium | Te laat |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Te weinig blad | Stadium rozet | Stadium bloei |

Schermbloemigen

ZYPAR MATTERA RENITAR 1 L/ha

- **ZYPAR MATTERA RENITAR**: van voorjaarsonkruiden tot (meerjarige) schermbloemigen.
- Naast een heel goede werking op diverse voorjaarsonkruiden, werkt de combinatie **florasulam+arylex** ook zeer goed op schermbloemigen. Fluitekruid is zeker het meest voorkomend schermbloemige onkruid in grasland.
- Op moeilijkere schermbloemige onkruiden zoals bereklauw is het aan te raden **triclopyr** toe te voegen om een volledige afdoding te hebben.
- **ZYPAR MATTERA RENITAR** kunnen perfect gemengd worden met de andere herbiciden, onder meer ook **BOFIX**, om het spectrum compleet te maken.

Tabel stadium FLUITEKRUID en SCHERMBLOEMIGEN

| Te vroeg | Optimaal stadium | Te laat |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Te weinig blad | Stadium rozet | Stadium bloei |

Onkruidspectrum tegen meerjarige onkruiden in stadium rozet

| | BOFORT | DOXSTAR PASTOR | TREVISTAR | DOXSTAR + PREVAIL THISTLEX | DOXSTAR + ZYPAR |
|----------------------|--------|----------------|-----------|-------------------------------|--------------------|
| DOSIS in L/ha | 2 L | 2 L | 1.5 L | 1+1 L | 1.5+1L |
| Akkerboterbloem | MS | S | SS | S | S |
| Akkerdistel | SS | MS | SS | SS | MS |
| Akkerwinde | S | S | MS | S | S |
| Bereklaaw | R | MS | MS | MS | S |
| Braam | S | SS | R | SS | SS |
| Fluitekruid | R | MS | MR | MS | SS |
| Grote brandnetel | SS | SS | MS | SS | SS |
| Haagwinde | S | S | SS | S | SS |
| Jakobskruiskruid | SS | R | S | MS | R |
| Japanse duizendknoop | S | SS | R | SS | SS |
| Klaver | SS | SS | SS | SS | SS |
| Kruipende boterbloem | MS | MS | SS | MS | SS |
| Krulzuring | SS | SS | R | SS | SS |
| Madeliefje | R | SS | R | SS | SS |
| Paardebloem | SS | S | SS | SS | S |
| Ridderzuring | SS | SS | MS | SS | SS |
| Scherpe boterbloem | MS | MS | MR | MS | MS |
| Speerdistel | SS | MS | S | S | MS |
| Weegbree | S | MS | MS | MS | SS |
| Witte dovenetel | R | MS | R | MS | S |

SS Efficiëntie > 95%

S Efficiëntie 75-95%

MS Efficiëntie 60-75%

MR Efficiëntie 50-60%

R Efficiëntie <50%

P: Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2022 CORTEVA