

VADEMECUM NAJAAR 2023

Herbiciden Grasland/Grassen

ProClovaTM

NIEUW

Voor grasland met witte klaver



CORTEVATM
agriscience

Inhoudstafel

Herbiciden grasland/grassen	p.3
Dosis-Toepassing	p. 4 en 5
ProClova op basis van RINSKOR™ active	p. 6 tot 8
Werkingspectrum ProClova	p. 9
Onkruidbestrijding in grasland	p. 10 tot 12
Herbiciden in een jong stadium van de onkruiden	
MATTERA RENITAR ZYPAR	p. 10
PRIMSTAR	p. 11
SPITFIRE	p. 11
TREVISTAR	p. 11
Herbiciden in een jong/ontwikkeld stadium van de onkruiden	
DOXSTAR PASTOR	p. 12
PREVAIL THISTLEX	p. 12
Bestrijding van zuring	p. 13
Bestrijding van distels	p. 14
Bestrijding van schermbloemigen	p. 15
Bestrijding van houtachtige planten	p. 16 en 17
Bestrijding van giftige planten	p. 18 en 19
Breed werkingspectrum	p. 20 tot 22
Tegen meerjarigen	p. 23





Herbiciden grasland/grassen

Samenstelling van alle herbiciden vermeld in deze brochure

PRODUCTEN	SAMENSTELLING	ERKENNINGSNR.
DOXSTAR	150 g/L triclopyr + 150 g/L fluroxypyr	10698P/B
MATTERA	6 g/L cloquintocet-mexyl + 5 g/L florasulam + 6.25 g/L halauxifen-methyl	10657P/B
PASTOR	150 g/L triclopyr + 150 g/L fluroxypyr	10699P/B
PREVAIL	200 g/L triclopyr + 200 g/L clopyralid	10774P/B
PRIMSTAR	2.5 g/L florasulam + 100 g/L fluroxypyr	9327P/B
PROCLOVA	75,49 g/kg florpyrauxifen-benzyl* + 360 g/kg amidosulfuron	29980P/B
RENITAR	6 g/L cloquintocet-mexyl + 5 g/L florasulam + 6.25 g/L halauxifen-methyl	10656P/B
SPITFIRE	5 g/L florasulam + 100 g/L fluroxypyr	10187P/B
THISTLEX	200 g/L triclopyr + 200 g/L clopyralid	10750P/B
TREVISTAR	2.5 g/L florasulam + 100 g/L fluroxypyr + 80 g/L clopyralid	9799P/B
ZYPAR	6 g/L cloquintocet-mexyl + 5 g/L florasulam + 6.25 g/L halauxifen-methyl	10655P/B

*Rinskor™ active, commerciële naam voor florpyrauxifen-benzyl

Dosis-Toepassing

PRODUCT	DOSIS/HA	PERIODE	TEMPERATUUR
DOXSTAR	2L	Vegetatieve groeifase	15 tot 25°C
MATTERA	0.75/1L	1L voorjaar/0.75L najaar	4 tot 25°C
PASTOR	2L	Vegetatieve groeifase	15 tot 25°C
PREVAIL	1L	Vegetatieve groeifase	15 tot 25°C
PRIMSTAR	2L	Voorjaar/najaar	7 tot 25°C
PROCLOVA	85 tot 125g	1 maart tot 31 oktober	5 tot 25°C
RENITAR	0.75/1L	1L voorjaar/0.75L herfst	4 tot 25°C
SPITFIRE	1L	Voorjaar/najaar	7 tot 25°C
THISTLEX	1L	Vegetatieve groeifase	15 tot 25°C
TREVISTAR	1.5L	Vegetatieve groeifase	10 tot 25°C
ZYPAR	0.75/1L	1L voorjaar/0.75L najaar	4 tot 25°C



STADIUM ONKRUIDEN

Stadium rozet tot begin bloemstengel

3 blad tot rozet

Stadium rozet tot begin bloemstengel

Stadium rozet tot begin bloemstengel

Stadium rozet tot begin bloemstengel

Stadium 3 blad of in een gevestigd gewas

3 blad tot rozet

Stadium rozet tot begin bloemstengel

Stadium rozet tot begin bloemstengel

Stadium rozet tot begin bloemstengel

3 blad tot rozet





ProClova™

op basis van Rinskor™ active

Een nieuw herbicide dat een onkruidbestrijding mogelijk maakt in graslanden met witte klaver, ook voor de bestrijding van meerjarige onkruiden

Samenstelling WG-formulering 75 g/kg **RINSKOR** + 360 g/kg amidosulfuron
Selectief in alle grassen en witte klaver

Rinskor is het tweede lid van de familie van de Arylpicolinaten (synthetische auxines) na **ARYLEX**

Zeer lage dosis per ha

Werking via opname door blad vanaf 5°C

Snelle afbraak in de bodem

Amidosulfuron

Een gekend Sulfonylureum

Lage dosis per ha

Werking via opname door blad en wortel

Tragere afbraak in de bodem verzekert de nawerking van het product

Weinig temperatuursafhankelijk

Selectiviteit

Een vertraging in de groei van de witte klaver wordt soms waargenomen enkele dagen na de behandeling

De klaver herneemt zich later vanzelf of na een snede.



Proef Falden ProClova
85gr/ha



Proef Falden ProClova
125gr/ha



Proef Falden getuige

Vervanggewassen en volggewassen in de rotatie

MOGELIJK NA ...	ZAAI VAN ...
42 dagen	Klaver
90 dagen	Mais Grasland Alle granen
In de rotatie Indien toepassing in het voorjaar enige gewassen mogelijk in het najaar	Alle granen Koolzaad Raaigras
In de rotatie Indien toepassing in oktober enige gewassen mogelijk in volgend voorjaar	Luzerne Aardappelen Mais

Gevoeligheid van verschillende vlinderbloemigen aan ProClova

VLINDERBLOEMIGE	GEVOELIGHEID	OK/NIET OK
Rolklaver	Heel resistent	OK
Witte klaver	Resistent	OK
Rode klaver	Gevoelig	VOORZICHTIG*
Luzerne	Gevoelig	NIET OK
Inkarnaatklaver	Gevoelig	NIET OK
Esparcette**/ Wikke	Heel gevoelig	NIET OK

*ProClova is selectief voor rode klaver op voorwaarde dat er minimum 10 maanden zit tussen de zaai van de rode klaver en de toepassing van ProClova

**Onobrychis viciifolia



Voor de bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden

Teelt: maai- en graasweides/grasland

Toepassingsstadium jong grasland: grassen stadium 3-blad, vlagblad volledig uitgegroeid en witte klaver minimum 3 echte bladeren

Maximaal aantal toepassingen 1 toepassing/36 maanden

Dosis 85 g/ha op witte klaver met minimum 3 echte bladeren

Of

Toepassingsstadium gevestigd grasland met witte klaver van minimum 3 echte bladeren

Maximaal aantal toepassingen 1 toepassing/12 maanden

Dosis 125 g/ha

Wachttijd van 7 dagen voor maaien of begrazen

Wachttijd van 10 dagen tussen maaien/begrazen en een behandeling

Toepassing tussen 1 maart en 31 oktober

Risicobeperkende maatregelen: Bufferzone van 20 m ten aanzien van oppervlaktewater met minimum 90% driftreductie



Jonge grasland



Oude grasland

Werkingsspectrum

PROCLOVA 85 tot 125 g/ha	
Akker-vergeet-me-nietje	SS
Bereklauw	SS
Bingelkruid	S
Boterbloem	S
Fluitekruid	SS
Herderstasje	SS
Herik	SS
Hondspeterselie	SS
Kamille	S
Kleefkruid	SS
Knopherik	S
Krulzuring	SS
Melganzevoet	S
Melkdistel éénjarig	MS
Muur	S
Paardebloem	SS
Perzikkruid	SS
Phacelia	SS
Pinksterbloem	SS
Ridderzuring	SS
Smalle weegbree	SS
Varkensgras	MS
Veldkers	S
Wilde peen	SS
Zwaluw tong	MS
Zwarte nachtschade	S



Herderstasje



Pinksterbloem



Paardebloem



Krulzuring

SS Efficiëntie > 95%

S Efficiëntie 75-95%

MS Efficiëntie 60-75%

MR Efficiëntie 50-60%

R Efficiëntie <50%

_ Geen informatie

Onkruidbestrijding in grasland

De zachte temperaturen in het najaar en een vochtige bodem zijn uiterst geschikt voor enerzijds de groei van meerjarige onkruiden en anderzijds voor het slagen van de onkruidbestrijding. **Zuring en distels** zijn zeker de meest voorkomende meerjarige onkruiden in grasland alsook de meest moeilijke om op lange termijn te bestrijden. Deze meerjarige onkruiden zorgen voor een sterke concurrentie met het gras en beïnvloeden zo de **opbrengst** en de **voederwaarde**. Bovendien breiden deze onkruiden jaar na jaar uit indien niet wordt ingegrepen.

De productie van ruwvoer waarin een onkruidbestrijding werd uitgevoerd

- Verhoogt de voederefficiëntie en optimaliseert de voederratio
- Laat toe meer melk/m² te produceren
- Zorgt voor een langere levensduur van de veestapel
- Vermijdt de verspreiding van (giftige) onkruiden op het bedrijf

Herbiciden in een jong stadium van de onkruiden

ZYPAR MATTERA RENITAR

Dosis 0,75 L in najaar tot 1 L/ha in winter en voorjaar

In alle grassen

Tegen éénjarige en meerjarige doorlevende onkruiden

Toepassingsstadium van september tot eind december

3 bladeren ontvouwen tot einde uitstoeling, maximaal aantal stoelen zichtbaar

Maximum aantal toepassing 1/jaar

Risicobeperkende maatregelen

Bufferzone van 10 m t.o.v. oppervlaktewater met min. 90% driftreductie

Dosis 1 L/ha

Toepassingsstadium vanaf januari tot eind juni

3 bladeren ontvouwen tot laatste blad

Voor zaadproductie, behandel op stadium uitstoeling van de grassen

Maximum aantal toepassing 1/jaar

Risicobeperkende maatregelen

Minimale bufferzone van 1 m t.o.v. oppervlaktewater met minimum 90% driftreductie

PRIMSTAR

Dosis 1 L/ha op éénjarige onkruiden tot 2 L/ha op meerjarige onkruiden

SPITFIRE

Dosis 0.75 tot 1 L/ha

PRIMSTAR SPITFIRE zijn formuleringen op basis van fluroxypyr en florasulam

Het spectrum is breder dan dat van **PRIMUS** en vooral sneller

Ideaal voor een vroege onkruidbestrijding

Tegen éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden: muur, herderstasje, kamille, kruiskruid, varkensgras... en de meerjarige zoals zuring, boterbloem, paardebloem, jong Jacobskruiskruid...

Toepassingsstadium gevestigd gewas, van maart tot oktober, vanaf 3 bladeren zichtbaar

Maximum aantal toepassing 1/jaar

Wachttijd voor maaien, grazen, inkuilen: 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen

Bufferzone van minimaal 1 m t.o.v. oppervlaktewater met min. 75% driftreducerende techniek

TREVISTAR

Dosis 1,5 L/ha

In alle grassen

TREVISTAR is een combinatie van fluroxypyr, florasulam en clopyralid met een heel breed werkingsspectrum

Tegen éénjarige onkruiden: muur, herderstasje, kamille, kruiskruid, varkensgras... alsook meerjarige onkruiden zoals boterbloem, paardebloem, jong Jacobskruiskruid, jonge zuring, jonge brandnetel, distels, smalle weegbree...

Toepassingsomstandigheden: kan worden toegepast vanaf 10–15°C in functie van de aanwezige onkruidflora

Toepassingsstadium 3 bladeren zichtbaar, gedurende de actieve groei

Maximum aantal toepassing 1/jaar

Wachttijd voor grazen, maaien, inkuilen 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen

Minimale bufferzone van 1 m t.o.v. oppervlaktewater met minimum 90% driftreductie

Herbiciden in een jong of ontwikkeld stadium van de onkruiden

DOXSTAR PASTOR

Dosis 2 L/ha

Tegen één- en meerjarige breedbladige onkruiden in voor- en najaar

Toepassingsperiode in voor- of najaar

Aantal toepassingen 1/jaar max. 2 L/ha/jaar, max. 480 g triclopyr/ha/jaar

Of 2 toepassingen/jaar aan een dosis van max. 1 L/ha, eerste toepassing in voorjaar gevolgd door een tweede toepassing in najaar

Wachttijd voor grazen/maaien/inkuilen 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen

Bufferzone van 2 m t.o.v. oppervlaktewater met minimum 75% driftreducerende techniek

PREVAIL THISTLEX

Dosis 1 L/ha

PREVAIL THISTLEX bevat een hoge dosis clopyralid

Tegen distels en andere composieten zoals paardebloem, melkdistel, madeliefje...

Uitstekende partner om te mengen met herbiciden op basis van florasulam of **DOXSTAR PASTOR** om het spectrum te vervolledigen

Toepassingsstadium in na- of voorjaar op ontwikkelde onkruiden

Maximum aantal toepassing 1/jaar max. 480 g triclopyr/ha/jaar


Wachttijd voor maaien/begrazen/inkuilen 7 dagen

Risicobeperkende maatregelen

Minimale bufferzone van 1 m t.o.v. oppervlaktewater



Ruwe melkdistel



Brandnetel



Madeliefje



Paardestaart

Bestrijding van zuring

DOXSTAR PASTOR 2 L/ha

In het najaar profiteert zuring van het zakken van de temperaturen om zich snel te ontwikkelen.

Zuring behoort tot de familie van de veelknopigen en bevat verschillende soorten: ridderzuring, krulzuring, schapezuring...

Het wortelsysteem bevat de reservestoffen van de plant en kan tot 2 m diep zitten.

Om een goed resultaat van de onkruidbestrijding te behalen, is het aan te raden om de planten in een rozetstadium met gezond blad te gaan behandelen (foto in het midden). Een goede bladmassa is belangrijk om voldoende actieve stof te kunnen opnemen en naar de wortels te transporteren.

Groeizame omstandigheden zijn steeds bevorderend.

Wacht na een snede minimum 3 weken om opnieuw een mooi rozet te krijgen alsook voldoende zuringplanten om te gaan behandelen. Een behandeling op zuring in een jong stadium (3-4 blad) kan tegenvallen (linkse foto). Maar ook een te late behandeling op planten met bloemknoppen geven mindere resultaten. In dit stadium gaat de plant verhouten en wordt het transport van de actieve stof via de sapstroom beperkt.

Te vroeg



Te weinig ontwikkeld

Optimaal stadium



Rozetstadium

Te laat



Stadium bloei



Bestrijding van distels

PREVAIL THISTLEX 1 L/ha

TREVISTAR 1.5 L/ha

Akkerdistel beschikken over een diep wortelstelsel (tot wel 5-6 meter) om water en voedingsstoffen op te nemen. Deze distels komen vaak voor in plekken verspreid in het grasland die elk jaar uitbreiden door hun rhizomen. Deze distel heeft een voorkeur voor humus- en stikstofrijke bodems.

De vermenigvuldiging gebeurt door zaai of vegetatief via de rhizomen.

Om een goede afdoding van deze rhizomen te krijgen, wordt er bij voorkeur behandeld op distels met een grootte van 10 tot 30 cm met voldoende bladmassa om optimaal het product te kunnen opnemen.

Wanneer de plant bloeit, wordt de sapstroom minder. Het is daarom beter eerst te maaien en daarna op de hergroei te gaan behandelen.



Speerdistel is een tweejarige plant. In het eerste jaar vormt ze een rozet, in het 2de jaar gaat de plant gebruik maken van de ondergrondse reservestoffen en zich gaan oprichten en bloeien.

Bestrijden gaat dus beter in het eerste jaar, in het rozetstadium.



Bestrijding van schermbloemigen

ZYPAR MATTERA RENITAR 1 L/ha

PROCLOVA 125 g/ha

De bestrijding van schermbloemigen vindt bij voorkeur plaats in het rozetstadium van het onkruid.

Op fluitekruid ZYPAR MATTERA RENITAR 1 L/ha

Te vroeg



Te weinig ontwikkeld

Optimaal stadium



Rozetstadium

Te laat



Stadium bloei

Op bereklauw PROCLOVA 125 g/ha

Te vroeg



Te weinig ontwikkeld

Optimaal stadium



Rozetstadium

Te laat



Stadium bloei

Andere combinaties op schermbloemigen

DOXSTAR PASTOR 1.5 L/ha + ZYPAR MATTERA RENITAR 1 L/ha

Zevenblad



Peen



Gevlekte scheerling



Bestrijding van houtachtige planten

DOXSTAR PASTOR 2 L/ha

Wanneer houtachtige planten niet worden bestreden dan kunnen ze op de lange termijn struiken, bosjes vormen aan de rand van de weiden. Hieronder vallen bv. bramen, brem, Sint-Janskruid, zwarte vlier. Sommige planten zijn zelfs giftig voor de dieren zoals gewone esdoorn.

Om goed tot in dergelijke dichte begroeiing te komen, is het aangeraden eerst de te bestrijden zone te maaien en daarna te gaan behandelen op de nieuwe scheuten met een middel dat de grassen spaart zoals **DOXSTAR, PASTOR**. Deze herbiciden zijn, dankzij hun systemie, uitstekend voor een langdurige bestrijding van dergelijke houtachtige planten.



Bramen



Gewone esdoorn



Gewone brem



Gewone vlier



Berk



Vlinderstruik

Tegen haagwinde

ZYPAR/RENITAR/MATTERA 0.75 l/ha

PRIMSTAR 2 L/ha

SPITFIRE 1 L/ha

TREVISTAR 1.5 L/ha

Te vroeg



Te weinig ontwikkeld

Optimaal stadium



Rozetstadium

Te laat



Stadium bloei

Tegen akkerwinde

DOXSTAR PASTOR 2L/ha

Te vroeg



Te weinig ontwikkeld

Optimaal stadium



Rozetstadium

Te laat



Stadium bloei



Bestrijding van giftige planten

Verschillende planten zijn giftig tot zeer giftig. Giftige planten kunnen een nefaste invloed hebben op de gezondheid van de veestapel en de kwaliteit van de melk of het vlees bederven.

In weiden zijn de meest voorkomende giftige planten Jacobskruiskruid, boterbloemen, schermbloemigen, doornappel...

Het merendeel van deze planten wordt niet begraasd aangezien ze bitter smaken, maar niet allemaal!

Na een maaibeurt of een onkruidbestrijding vermindert de bitterheid en worden de planten meer gesuikerd dus aantrekkelijker voor het vee. Toxische alkaloiden kunnen aanwezig blijven in het hooi of de kuil en zo het vee gaan vergiften.

Nuttige tips voor de bestrijding van giftige planten

Behandel vooraleer het vee op de weide komt of voor een snede.

In het voorjaar zijn de giftige planten nog klein waardoor ze makkelijker te bestrijden zijn.

In de zomer zijn deze planten over het algemeen meer verhout waardoor ze moeilijker te bestrijden zijn. Een afgestorven plant (bijvoorbeeld Jacobskruiskruid) kan giftig blijven.

Deze brochure is niet alles omvattend. Indien u twijfelt over een plant, neem dan een kijkje op

www.flora-west-europa.eu



Doornappel



Aronskelk



Gewoon vingerhoedskruid



Monnikskap


Op boterbloemen: ZYPAR MATTERA RENITAR 1 L/ha



Op Jacobskruiskruid: TREVISTAR 1.5 L/ha



Op doornappel: TREVISTAR 1.5 L/ha of PREVAIL THISTLEX 1 L/ha



Op gevlekte scheerling en andere schermbloemigen:

PROCLOVA 125 g/ha

of DOXSTAR PASTOR 1.5 L/ha + **ZYPAR MATTERA RENITAR** 1 L/ha

Breed werkingsspectrum

Product	DOXSTAR/ PASTOR	PREVAIL/ THISTLEX	PRIMSTAR/ SPITFIRE	TREVISTAR	ZYPAR/ MATTERA/ RENITAR
A tot G					
Akkerboterbloem	S	MS	SS	SS	SS
Akkerdistel	R	SS	MR	S	R
Akkerhoornbloem	SS	MS	SS	SS	SS
Akkerleeuweklauw	–	–	–	–	MS
Akkermelkdistel	MR	SS	MR	S	–
Akkerpaardestaart	SS	MS	R	R	R
Akkerviooltje	R	R	R	R	R
Akkerwinde	S	MS	MS	MS	R
Amarant	–	–	–	–	SS
Bereklauw	MS	MS	MR	MS	S
Bijvoet	R	R	MS	MS	MR
Bingelkruid	R	R	S	S	SS
Boerenkers	R	R	SS	SS	SS
Bramen	SS	MR	R	R	R
Doornappel	S	S	MS	S	MS
Driedelig tandzaad	R	SS	SS	SS	–
Duivekervel	MR	R	MR	MR	SS
Duizendblad	MR	MS	MR	S	MR
Ereprijs	R	R	R	R	R
Fluitekruid	MS	MS	R	MS	SS
Gevlekte scheerling	MS	MS	MR	MR	SS
Gewone brem	SS	S	–	SS	–
Gewone melkdistel	R	SS	MS	SS	S
Groot hoefblad	R	S	R	MS	R
Grote brandnetel	SS	MS	S	S	MR
Grote weegbree	MS	R	R	R	R
Guichelheil	MS	MS	SS	SS	–

Product	DOXSTAR/PASTOR	PREVAIL/THISTLEX	PRIMSTAR/SPITFIRE	TREVISTAR	ZYPAR/MATTERA/RENITAR
H tot M					
Haagwinde	S	MR	SS	SS	SS
Hennepnetel	MS	MS	MR	MR	SS
Herderstasje	R	R	SS	SS	SS
Herik	R	R	SS	SS	SS
Hoenderbeet	MS	MS	MR	MR	SS
Hondspeterselie	S	SS	SS	SS	SS
Jacobskruiskruid	R	MS	MR	S	MS
Kamille	R	R	S	SS	SS
Klaproos	R	R	S	S	SS
Kleefkruid	SS	MS	SS	SS	SS
Klein hoefblad	MR	SS	MS	S	R
Kleine brandnetel	MS	MS	S	S	S
Klimopereprijs	R	R	R	R	R
Knopherik	R	R	SS	SS	SS
Knopkruid	R	SS	SS	SS	SS
Korenbloem	MR	SS	S	SS	SS
Kroontjeskruid	S	MR	S	S	—
Kruipende boterbloem	MS	MR	SS	SS	SS
Kruiskruid	R	SS	MS	SS	S
Krulzuring	SS	MR	S	S	R
Luzerne	R	S	SS	SS	R
Madeliefje	MR	SS	MS	S	S
Melganzevoet	R	R	R	R	SS

SS Efficiëntie > 95%

S Efficiëntie 75-95%

MS Efficiëntie 60-75%

MR Efficiëntie 50-60%

R Efficiëntie <50%

_ Geen informatie

Product	DOXSTAR/ PASTOR	PREVAIL/ THISLEX	PRIMSTAR/ SPITFIRE	TREVISTAR	ZYPAR/ MATTERA/ RENITAR
P tot Z					
Paardebloem	S	SS	S	SS	SS
Paarse dovenetel	MS	MS	MR	MR	SS
Perzikkruid	MS	MS	MR	MS	MR
Raket	R	R	SS	SS	SS
Ridderzuring	SS	MR	S	S	R
Rondbladige ooievaarsbek	MS	MS	MR	MR	SS
Ruwe melkdistel	R	SS	MS	SS	S
Schapezuring	SS	S	MS	S	R
Scherpe boterbloem	MS	R	S	S	SS
Slipbladige ooievaarsbek	MS	MS	MR	MR	SS
Smalle weegbree	MS	S	R	S	MS
Speerdistel	R	S	MR	MS	R
Uitstaande melde	R	R	R	R	R
Varkensgras	MS	S	MR	MS	MR
Veenwortel	MS	MS	S	S	S
Veldkers	R	R	SS	SS	SS
Vergeet-me-nietje	SS	S	SS	SS	S
Vogelmuur	SS	S	SS	SS	SS
Wilde peen	MS	MS	R	MS	S
Witte dovenetel	MS	MS	MR	MR	S
Witte klaver	SS	SS	S	SS	SS
Zevenblad	MS	MS	MS	MS	SS
Zwaluwtong	SS	SS	SS	SS	SS
Zwarte nachtschade	S	SS	SS	SS	SS

Tegen meerjarigen

Product	DOXSTAR/PASTOR	TREVISTAR	DOXSTAR+ PREVAIL/THISTLEX	DOXSTAR+ ZYPAR
DOSIS in L/ha	2 L	1.5 L	1+1 L	1.5+1L
Akkerboterbloem	S	SS	S	SS
Akkerdistel	MS	SS	SS	MS
Akkerpaardestaart	SS	R	SS	SS
Akkerwinde	S	MS	S	S
Bereklauw	MS	MS	MS	S
Bramen	SS	R	SS	SS
Doornappel	S	S	S	S
Fluitekruid	MS	MR	MS	SS
Grote brandnetel	SS	MS	SS	SS
Haagwinde	S	SS	S	SS
Jacobskruid	R	S	MS	R
Japanse duizendknoop	SS	R	SS	SS
Klaver	SS	SS	SS	SS
Kruipende boterbloem	MS	SS	MS	SS
Krulzuring	SS	R	SS	SS
Paardebloem	S	SS	SS	S
Ridderzuring	SS	MS	SS	SS
Scherpe boterbloem	MS	MR	MS	S
Speedistel	MS	S	S	MS
Weegbree	MS	MS	MS	SS
Witte dovenetel	MS	R	MS	S


SS Efficiëntie > 95%

S Efficiëntie 75-95%

MS Efficiëntie 60-75%

MR Efficiëntie 50-60%

R Efficiëntie <50%

_ Geen informatie



P: Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg <https://fytowebe.nl/toelatingen>

™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2023 CORTEVA