



Voorjaarstoepassing



Gamma aan herbiciden selectief in alle grassen
Flexibel gamma dat een oplossing biedt het ganse jaar door

Onkruidbestrijding in grasland

P : P: Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

www.corteva.com

Dol 0220



Onkruidbestrijding in grasland

2018 & 2019 waren twee jaren die gekenmerkt werden door een lange periode van droogte en die bij gevolg de staat van de graslanden sterk hebben beïnvloed. In de zomer waren de graslanden volledig "verschroeid", waardoor kale plekken ontstonden die ideaal waren voor de kieming van onkruid van zodra de eerste regen viel. Bezoek uw graslanden zodat u een goede inschatting kan maken van de situatie en de juiste beslissingen kan nemen inzake een onkruidbestrijding.

Belang van vroeg behandelen

Een toepassing in maart-april bestrijdt alle voorjaaronkruiden en stopt meteen de concurrentie met het raaigras. Dit resulteert uiteindelijk in een hogere opbrengst en een betere ruwvoerwaliteit. Onkruid moet worden behandeld in groeizame omstandigheden en steeds voor de bloei. Een vroege onkruidbestrijding maakt het daarnaast mogelijk om nog in goede omstandigheden gras in te zaaien of door te zaaien. Een ander niet onbelangrijk voordeel is dat het vee nog niet in de weide staat wat een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert.

Welke herbiciden kiezen?

Bij relatief lage temperaturen genieten formuleringen op basis van PRIMUS (Florasulam) de voorkeur. Ze zijn doeltreffend vanaf 5 °C en zeer selectief ten opzichte van alle gras. De formuleringen PRIMSTAR, SPITFIRE die PRIMUS & STARANE FORTE combineren, zijn doeltreffend vanaf 8°C en zijn ook perfect selectief. TREVISTAR, die MATRIGON bevat, vereist een minimum van 10°C door de aanwezigheid van clopyralid.

En dan zuring... een geval apart!

De bestrijding van zuring is apart en specifiek. Om een doeltreffend resultaat te hebben, dient de behandeling van zuring uitgevoerd te worden op planten die zich in het rozetstadium bevinden en voldoende bladmassa hebben. Zachte temperaturen zijn noodzakelijk om het transport van de actieve stof van de bladeren naar het wortelstelsel te bevorderen en een goede afdoding tot in de diepte te krijgen.

Voorjaarstoepassingen

Herbiciden op basis van Florasulam Primus™, Primstar™, Spitfire™, Trevistar™

Deze herbiciden zijn doeltreffend bij lage temperaturen en beschikken over een breed werkingsspectrum naar voorjaaronkruiden toe.

PRIMUS 100mL/ha bestrijdt herderstasje, veldkers, muur, raket, paardebloem (rozet), kruipende boterbloem...

PRIMSTAR 2 L/ha en SPITFIRE 1 L/ha bestrijden herderstasje, veldkers, muur, raket, paardebloem (rozet), kruipende boterbloem alsook hoornbloem, akkerboterbloem, veelknopigen, jonge zuring...

TREVISTAR 1.5 L/ha bestrijdt herderstasje, veldkers, muur, raket, paardebloem (rozet), kruipende boterbloem en daarbovenop hoornbloem, akkerboterbloem, veelknopigen, jonge zuring alsook madeliefje, paardebloem (ontwikkeld), speerdistel, Jacobskruiskruid...



Als de omstandigheden gunstig zijn om zuring te bestrijden, meng dan één van de bovengenoemde formuleringen met **Bofort™, Doxstar™, Pastor™**

BOFORT 1.5 L/ha, Het is dé absolute referentie voor de bestrijding van zuring en distels! BOFORT, uitstekend tegen zuring, paardebloem, Jacobskruiskruid, akkerdistel, speerdistel zelfs ontwikkelde planten...

Let op! Bevat aminopyralid, lees aandachtig de gebruiksbepalingen.

DOXSTAR of PASTOR 2 L/ha, Herbiciden op basis van triclopyr + fluroxypyr, doeltreffend tegen zuring in het rozetstadium en brandnetel, schermbloemigen... Erkend in alle graslanden in de lente en de herfst.

